

- nova 38. *St. iridibus flavis, corpore supra fusco albo-maculato, subtus fulvo.*
 Seelandia. *New Zealand Owl. Lath. syn. I. 1. p. 149. n. 39.*
Habitat in nova Seelandia, passerinae magnitudine; rostro corneo apice nigro. Forster.
- cayen- 39. *St. corpore rufo striato, transversim fusco undulato, nensis. iridibus flavis.*
Chat huant de Cayenne. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 391. pl. enlum. n. 442.
Cayenne Owl. Lath. syn. I. 1. p. 146. n. 35.
Habitat in Cayenna, magnitudine stridula; rostrum corneum; ungues nigri.
- domini- 40. *St. corpore subtus rufo, pectore parumper maculato. censis.*
Chouette ou grande Chevêche de S. Domingue. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 392. n. 6.
S. Domingo Owl. Lath. syn. I. 1. p. 146. n. 34.
Habitat in insula S. Dominici, ululae perquam affinis, rostro tamen majore, robustiore, magis adunco distincta.
- Tolchi- 41. *St. iridibus pallide flavis, corpore supra nigro, pallide quatli. flavo, albo, & fulvo vario, subtus albo.*
Chouette du Mexique. Briss. orn. I. p. 524. n. 10.
Tolchiquatli. Raj. av. p. 160.
New Spain Owl. Lath. syn. I. 1. p. 145. n. 32.
Habitat in nova Hispania.
Rostrum, ungues, tectrices alarum inferiores nigra.
- Chichic- 42. *St. corpore fulvo, albo fusco & nigro vario, oculis nigris, tli. palpebris caeruleis.*
Chat huant du Mexique. Briss. orn. I. p. 523. n. 9.
Chichictli. Raj. av. p. 160.
Mexican Owl. Lath. syn. I. 1. p. 144. n. 31.
Habitat in nova Hispania, gallinae magnitudine.
- acadica. 43. *St. corpore supra spadiceo albo-maculato, subtus fordide albo ferrugineo intermixto.*
Acadian Owl. Lath. syn. I. 1. p. 149. n. 38. t. V. f. 2.
Habitat in America septentrionali, 7 pollices longa.
Rostrum fuscum; irides flavae; vertex pallide maculatus; orbitae cinerea; digiti fusci.
- passerina. 42. *St. remigibus maculis albisquinque ordinum. Fn. suec. 79.*
Scop. ann. I. p. 22. n. 17.
Noctua minor. Briss. av. t. p. 514. Raj. av. p. 26. n. 6.