

Von Corea kennen wir dunkle, also typische Vögel (P. Z. S. London 1887 p. 581). Almásy hat in der Umgebung von Karkara und Przewalsk dunkle ♂ und helle ♀ von *A. accipitrinus* gesammelt — im Gegensatz zu den mir vorliegenden Merzbacher'schen Exemplaren — und Smallbones glaubt diese Differenzen in der Färbung auf Geschlechtsunterschiede zurückführen zu müssen, was sich schwer nachweisen läßt. Vergl. die interessanten Mittheilungen Heinroths über Färbungsphasen bei jungen Vögeln von *Locustella naevia* (Bodd.).

*Nyctale tengmalmi* (Gm.).

*Nyctala tengmalmi*, Menzbier, Ibis 1885 p. 258. — id. Ornith. Turkestan p. 374 (1894).

*Strix tengmalmi*, v. Homeyer & Tancre, Mitth. Ornith. Wien, 1883 p. 83.

130 b. ♀. Kaschka-su, 18. 8. 1902.

Das Merzbacher'sche Exemplar zeichnet sich gegenüber solchen aus Schlesien und Preussen durch einen sehr lichten Kopf und Schleier wie durch eine lichtere Unterseite des Körpers aus. Während bei westlich palaearktischen Individuen die Zeichnung auf den Steuerfedern nur durch langgezogene Flecke, die weder an den Schaft, noch an den Aufsenrand der Fahnen heranreichen, charakterisiert ist, zeigt sie bei dem vorliegenden Exemplar von der Fahne bis an den Schaft heran eine langgezogene Binde, die aber, am Schaft unterbrochen, nicht über die ganze Feder sich erstreckt. Ich halte mich aber nicht für berechtigt, auf Grund eines einzigen Exemplars und bei geringem Vergleichsmaterial eine neue „*pallens*“ Form abzusondern.

Sewerzow hat diese kleine Eule im eigentlichen Turkestan nicht gefunden. Sie brütet häufig im Altai (Johansen) und geht im Herbst und Winter von hier in die umgebenden Ebenen. Die Grenzen des Vorkommens, vornehmlich nach dem Südosten, sind noch unbekannt.

*Carine noctua bactriana* (Blyth.).

*Athene bactriana*, Pleske, Mém. Acad. imp. St. Pétersbg. 1888, p. 10. — Menzbier, Orn. Turk. p. 347 (1894). — Schalow, J. f. O. 1901 S. 427. — Walton, Ibis 1906 p. 242.

*Carine bactriana*, Pleske, Bull. Acad. imp. St. Pétersbg. 1892 p. 278. — Sharpe, Sec. Yard. Miss. Aves p. 14 (1891) taf. 3. — Berezowski et Bianchi, Aves Gansu p. 44 (1891).

*Carine noctua bactriana* Richmond, Pr. U. S. Nat. Mus. 1896 p. 456.

*Athene noctua bactriana*, Rothschild, Nov. Zoolog. 1902 p. 162.

130 a. Barskaun, 22. 10. 02.

Häufiger Brutvogel im ganzen Gebiet des Tiën-schan Gebirges. Turkestanvögel sind mit solchen des vorgenannten Gebirgszuges vollkommen identisch. Rothschild hat auf die nahen Beziehungen