

Genre PHASMOPTYNX, Kaup.

44. Phasmoptynx Capensis — *A. tingitanus*.

Phasmoptynx Capensis, CH. BONAP. *Tabl. des Ois. de proie, Rev. et Mag. de Zool.* (1854), p. 541, sp. 347, et *Phasmoptynx Capensis A. tingitanus*, *Catal. Parzud.* (1856), p. 2, sp. 49; — LOCHE, *Catal. des Mamm. et des Ois. obs. en Alg.* (1858), p. 48, sp. 42.

Otus Capensis, SMITH, *S. Afr. Quart. Journ.* (1835), p. 406, et *Ill. S. Afr. Zool.* t. 67; — GRAY, *List. B. Brit. Mus.* (1848), p. 108.

Brachyotus Capensis, CH. BONAP. *Consp. av.* (1850), p. 51, sp. 4.

La *Phasmoptynx Capensis* n'avait pas encore, que nous sachions, été rencontrée en Algérie lors de la capture que nous fîmes près de l'Harrach des deux individus de cette espèce, dont nous allons donner la description; tous les deux étaient adultes, l'un était un mâle et l'autre une femelle; leur livrée était semblable et leur taille ne différait pas sensiblement.

Cet Oiseau a la tête volumineuse; deux petites aigrettes peu distinctes; le disque facial arrondi; le bec noir, allongé, est en partie caché sous les plumes piliformes qui entourent sa base; l'oreille est munie d'un opercule très-étendu; les yeux sont bruns; les plumes rayonnantes du disque sont d'un gris enfumé avec la tige brune; elles sont rayées légèrement de brunâtre vers le cou; celles qui entourent les yeux sont noires et forment un large cercle; les plumes sétacées qui recouvrent le bec sont noires à leur pointe extrême; celles du dessous du bec sont blanches, et celles de la gorge brunes, semées et comme pectinées de taches d'un fauve clair; la poitrine est d'un brun très-enfumé varié de zigzags et de raies roussâtres peu apparentes; l'abdomen et les flancs sont d'un fauve ochracé, rayé et tacheté de brun et de blanchâtre, chaque plume ayant vers son extrémité deux grandes taches, très-apparentes d'un blanc sale; le bas ventre et les sous-caudales sont d'un fauve clair et ces dernières transversalement barrées de roux et de brun à quelque distance de leur extrémité qui est blanchâtre; toutes les parties supérieures sont d'un brun enfumé, mais varié à la tête, près du cou et sur le haut du dos de lignes grises et rousses un peu confondues; les petites aigrettes sont brunes au centre des plumes et comme chinées d'un brun plus clair, de gris et de fauve; le dos est d'un brun uniforme; le dessus des ailes, les couvertures alaires et les scapulaires sont d'un brunâtre pointillé, chiné et vermiculé de roux fauve; quelques taches, les unes rousses, les autres d'un blanc sale, sont répandues sur le fouet de l'aile et sur les scapulaires; les rémiges sont brunes et largement tachées de roux de rouille; ces taches par leur réunion forment, surtout sur les rémiges primaires, trois bandes irrégulières qui s'amoindrissent sur les suivantes; ces dernières, à mesure qu'elles s'éloignent des primaires, sont maculées de gris et d'un brunâtre qui passe successivement au fauve et au blanchâtre; les rémiges secondaires sont terminées de blanc fauve; le dessous des ailes est d'un joli fauve clair lustré, rayé et tacheté par plaques irrégulières d'un brun noirâtre luisant; les ailes sont longues et atteignent presque l'extrémité de la queue; cette dernière est longue et arrondie, elle montre six barres irrégulières alternativement brunes et roussâtres,

les quatre rectrices médianes étant d'un brun glacé de fauve et des taches rousses y formant trois raies transversales irrégulières; les latérales d'un brun plus maculé de fauve sont barrées de trois larges raies d'un roux qui passe au blanchâtre sur les pennes les plus extérieures; une large bande d'un blanc sale termine toutes les latérales; les mêmes bandes et les mêmes taches existent en dessous comme en dessus, seulement elles sont plus pâles et plus effacées quoique très-distinctes; les couvertures supérieures de la queue sont d'un brun enfumé et varié de lignes d'un fauve brunâtre terne; les cuisses et les jambes sont recouvertes de plumes soyeuses et duvetées, d'un joli isabelle très-affaibli; ces plumes deviennent de plus en plus courtes en approchant des doigts, ces derniers sont emplumés à leur base, mais ils ne sont recouverts en dessus que de poils clair-semés; le doigt externe est uni au médian par un petit repli membraneux; ils sont noirâtres et portent deux écailles nues sur leur extrémité; les ongles sont acérés et d'un brun de corne.

La longueur totale de l'Oiseau monté est de	0 ^m 38			
— de l'aile fermée	0 ^m 31			
— de la queue	0 ^m 16			
— du bec, à partir de l'angle.	0 ^m 028			
— — à partir du front.	0 ^m 030			
— du tarse.	0 ^m 050			
— du doigt médian sans l'ongle	0 ^m 035,	et de l'ongle en suivant sa courbure	0 ^m 021	
— du doigt externe.	0 ^m 022,	— — —	0 ^m 018	
— du doigt interne	0 ^m 029,	— — —	0 ^m 019	
— du pouce	0 ^m 027,	— — —	0 ^m 017	

Cet Oiseau, que nous supposons seulement de passage en Algérie, s'y rencontre particulièrement dans les joncs et les endroits très-couverts; nous ne savons rien de précis sur ses mœurs et ses habitudes et nous n'avons trouvé dans l'estomac de ceux que nous avons capturés que des débris de petits Mammifères.

L'Exposition permanente d'Alger possède le sujet type de cette description, dont nous avons été heureux d'enrichir ses galeries.

M. Malherbe, dans sa Faune ornithologique de l'Algérie, non plus que M. Wagner, et les autres auteurs qui ont écrit sur ce pays, n'a mentionné cette espèce, dont un nouvel individu vient d'être tué ces jours derniers, par un chasseur qui, dans un fourré, poursuivait des Bécasses.

Genre Duc — *Bubo*, Cuv.

45. Grand-Duc — *Bubo maximus*.

Bubo maximus, SIBBALD, *Scot. illustr.* II, liv. 3, p. 15; — CH. BONAP. *Birds* (1838), p. 6, et *Tabl. des Ois. de proie, Rev. et Mag. de Zool.* (1854), p. 541, sp. 348; — KEYS. et BLAS. *Die Wirbelth.* (1840), p. XXXIII; — LOCHE, *Catal. des Mamm. et des Ois. obs. en Alg.* (1858), p. 48, sp. 43.