

25 Mai 1862, près de Valkenswaard. — 7. Mâle, teintes tirant fortement au blanchâtre, tué le 25 Mai 1862, près de Valkenswaard. — 8. Femelle, tuée le 14 Mars 1849, Saxe, acquise en 1860. — 9. Femelle, teintes tirant fortement au roux, tuée le 16 Mai 1849, Saxe, acquise en 1862. — 10. Femelle, tuée le 9 Avril 1849, Saxe, acquise en 1862. — 11. Mâle, Ardennes. — 12. Femelle, teintes tirant fortement au roux, environs de Francfort sur le Mein, par Mr. Meyer. — 13. Mâle, tué en Janvier 1860, environs de Smyrne, acquis de Mr. Schlüter. — 14. Jeune, revêtu en partie de duvet; à face noire, pris du nid en Mai 1861, Brunswick, par Mr. le professeur Blasius. — 15. Jeune, revêtu en partie de duvet, à face roussâtre, pris du nid le 20 Juillet 1860, monts Sudètes, par Mr. Finsch. — 16. Jeune, revêtu en partie de duvet, à face en grande partie blanchâtre, pris du nid le 25 Juillet 1860, monts Sudètes, par Mr. Finsch. — 17, 18, 19. Jeunes en grande partie revêtus de duvet, agés environ de 15 jours, pris du nid le 10 Juillet 1859, monts Sudètes, par Mr. Finsch.

20. Squelette, Hollande. — 21. Squelette de mâle, Hollande, 1861.

OTUS VULGARIS AMERICANUS. — *Otus americanus*, Bonaparte. — *Otus Wilsonianus*, Lesson.

Remplace, dans l'Amérique du Nord, l'*Otus vulgaris*, dont il ne diffère que par les bandes rousses des grandes rémiges en grande partie marbrées de brun, ainsi que par les barres du plumage plus larges et plus foncées.

1. Adulte, à teintes tirant fortement au roux, Amérique du Nord, acquis en 1862. — 2. Adulte, Pennsylvanie. — 3. Adulte, à teintes tirant au blanc, Amérique du Nord.

OTUS MEXICANUS, G. Cuvier. — *Strix mexicana*, Gmelin. — *Strix longirostris*, Spix. — *Strix maculosa*, Pr. Max. *)

*) *Otus midas*, Lichtenstein, Nomencl. Mus. Berol., p. 6, est fondé sur

Taille, disque facial, et système de coloration en général comme dans l'Otus d'Europe; mais à ailes courtes et plus arrondies; à bec, doigts et ongles beaucoup plus robustes; à aigrettes plus longues, à duvet des doigts un peu moins serré et à parties inférieures d'un blanchâtre sans lignes transversales, mais par contre relevé par des mèches brunes. — Longueur totale 14 à 15 pouces. Aile 8 pouces à 10 pouces 4 lignes; pointe de l'aile 1 pouce 3 lignes à 2 pouces 6 lignes. Queue 4 pouces 6 lignes à 5 pouces 9 lignes. Oeil 6 lignes. Oreille 16 lignes. Aigrettes 21 à 27 lignes. Tarse 1 pouce 6 lignes à 2 pouces. Doigt du milieu 16 à 17 lignes. Quatrième rémige dépassant un peu la troisième; première égale à la septième. Dessous blanchâtre, avec de larges mèches brunes, sans lignes transversales.

Observé à la Guyane, au Brésil et en Colombie.

1. Adulte, Surinam, acquis en 1858. — 2. Adulte, Surinam. — 3. Adulte, à teintes tirant au blanc, Surinam, acquis en 1860. — 4. Jeune, le dessus de la tête encore revêtu de duvet, teintes du plumage tirant fortement au roux; Caracas, présenté par Mr. van Lansbergen. — 5. Jeune, revêtu en grande partie d'un duvet roussâtre, Surinam.

B. Aigrettes courtes. Sous-genre *Brachyotus* chez Gould.

OTUS BRACHYOTUS, Boié. — *Strix brachyotus*, Gmelin. — *Brachyotus palustris*, Gould. — *Brachyotus Cassinii*, Brewer. — *Otus* (*Brachyotus*) *galapagoensis*, Gould?

Tarse et doigts garnis d'un duvet bien fourni. Aile $11\frac{1}{4}$ à 12 pouces. Queue 5 pouces à 5 pouces 4 lignes. Tarse 19

un individu femelle d'un hibou sous tous les rapports semblable au *mexicanus*, mais d'une taille plus considérable. Il a été tué dans les environs de Montévidéo. Longueur totale 18 pouces. Aile 11 pouces 6 lignes. Pointe de l'aile 2 pouces. Queue 5 pouces 9 lignes. Aigrettes 33 lignes. Hauteur de la mandibule supérieure 5 lignes. Oeil 5 lignes et demie. Tarse 26 lignes. Doigt du milieu 19 lignes.