

²¹⁶
Nitters Carl von Linne'
Königlich Schwedischen Leibarztes u. u.
vollständigen
Natursystems
Supplement:
und
Register = Band
über alle
sechs Theile oder Classen des Thierreichs.
Mit einer
ausführlichen Erklärung ausgefertigt

von
Philipp Ludwig Stenius Müller,
Prof. der Naturgeschichte zu Erlang, Mitglied der Kön. Kaiserl.
Akademie, wie auch der Berlinischen Gesellschaft der
Naturforscher u.



Mit drei Kupfertafeln.

Mit Churfürstl. Sächsischer Freyheit.

M ü n c h e n ,
bey Gabriel Nicolaus Raspe, 1776.

70 Zweyte Cl. 1. Ordn. Habichte.

B.
Unge-
hörnte.

17. Die cajennische Eule. *Strix cajennensis*.

17.
Cajen-
nische
Eule.
Cajen-
nensis.

Der Schnabel ist rostgelb, und der ganze Körper gelblich-rostfärbig, aber mit kleinen schwarzen Wellen bezeichnet; wohnet in Cajenne. Des Buffons Chathuant de Cajenne.

18. Die domingische Eule. *Strix dominicensis*.

18.
Doming-
ische
Eule.
Domin-
gensis.

Der Schnabel ist sehr groß, der Körper rostfärbig gefleckt. Die Brust ist nur wenig gezeichnet, und der Bauch ganz weiß. Sie wohnet auf der Insel St. Domingo. Des Buffons Chouette de St. Domingue.

