

**NOUVEAU
DICTIONNAIRE
D'HISTOIRE NATURELLE,**

APPLIQUÉE AUX ARTS,

**A l'Agriculture, à l'Économie rurale et domestique,
à la Médecine, etc.**

**PAR UNE SOCIÉTÉ DE NATURALISTES
ET D'AGRICULTEURS.**

**Nouvelle Édition presque entièrement refondue et considé-
rablement augmentée ;**

AVEC DES FIGURES TIRÉES DES TROIS REGNES DE LA NATURE.

TOME VII

DE L'IMPRIMERIE D'ABEL LANGE, RUE DE LA HARPE.

A PARIS,

CHEZ DETERVILLE, LIBRAIRE, RUE HAUTEFEUILLE, N° 8.

M DCCC XVII.

cette couleur; parties supérieures d'un brun marron, parsemé de petits points blancs sur la tête et de quelques mouchetures arrondies sur les ailes; parties inférieures blanches, avec des bandes transversales d'un brun marron, très-rares sur le ventre, et nulles sur les parties postérieures; doigts velus; bec allongé, couleur de corne jaunâtre; taille un peu supérieure à celle de notre chevêche. Cet oiseau est au Muséum d'Histoire naturelle. Je ne connois pas son pays.

La CHOUETTE SUINDA, *Strix suinda*, Vieill. Nous devons la connoissance de cette chouette à M. de Azara, ou du moins une description plus détaillée de la chouette ou grande chevêche de Saint-Domingue, si, comme le dit Sonnini dans sa traduction, elles appartiennent l'une et l'autre à la même espèce; mais ce ne peut être la chouette ou grande chevêche d'Europe, puisque le suinda a la tête sans aigrette et que l'autre en a deux, courtes il est vrai, qui lui ont valu le nom de *brachyotos*. Le suinda n'entre point dans les bois et ne se perche pas sur les arbres; il fréquente les campagnes découvertes et abondantes en gibier, se cache dans les trous ou les terriers des tatous, mais il n'en creuse pas lui-même; ce qui suffit pour ne pas le confondre avec la chouette à terrier, qui fait elle-même celui dans lequel elle niche, et son seul abri dans les temps de repos: fait que j'ai vérifié à Saint-Domingue. Le *suinda* chasse une heure avant le coucher du soleil, volant en ligne directe et sans discontinuité à cinq à six pieds au-dessus du sol, pour fondre sur le gibier qu'il découvre. Il est fort rare, et ne se voit au Paraguay qu'au vingt-septième degré: cependant on dit qu'on le trouve plus communément au sud de la rivière de la Plata.

Il a quatorze pouces et demi de longueur; la collerette noirâtre, et tachée de gris roussâtre sur les bords, brune avec des lignes noirâtres au centre, avec un peu de blanc à l'angle antérieur de l'œil; les plumes de la tête, de la gorge et du cou d'une teinte sombre dans le milieu, et d'un brun roussâtre sur les bords; la couleur de la poitrine plus claire, avec des raies déliées et longitudinales; le ventre et les parties postérieures d'un gris roussâtre; quelques taches noires, oblongues et pointues sous l'aile; le dessus du corps, des ailes et de la queue noirâtre, varié de brun et moucheté de gris roussâtre; le bec sombre et l'iris jaune.

La CHOUETTE TENGMALM, *Strix tengmalmi*, Lath., a huit pouces quatre lignes de longueur; tout le corps d'un roux rembruni et noirâtre, avec des taches blanches, arrondies sur la tête et sur le dessus du cou; l'iris d'un jaune brillant; le bec jaune; les pieds et les doigts couverts d'un duvet blanc. La femelle est un peu plus forte que le mâle; son plu-