

## Fam. PSITTACIDÆ.

## 53. BOLBORHYNCHUS AURIFRONS (Less.).

Lima : septembre à novembre. } Nombreux exemplaires.  
 Ica : décembre 1890. }  
 " Iris brune claire."

## Fam. BUBONIDÆ.

54. ASIO CLAMATOR (Vieill.)<sup>1</sup>.

*Otus mexicanus*, Tacz. Orn. du Pérou, i. p. 192.

Ica : trois exemplaires de décembre 1889. " Iris jaune-orangée."

Ces oiseaux, comparés avec des exemplaires du Brésil méridional (Sta. Catharina), présentent des différences bien marquées, surtout dans la taille, qui est beaucoup plus petite (l'aile 236 à 260 au lieu de 285 mm., queue 128 à 143 au lieu de 163). Ils s'en distinguent aussi par le plumage beaucoup plus ocreux. La face postérieure est blanche et ne présente pas des taches de brun-roussâtre. Les aigrettes sont plus courtes.

Deux ♂♂. Long. tot. 350, 340, " enverg. 900," 845, aile 250, 236, queue 145, 128, bec 28, 21½, tarse 50, doigt médian (sans ongle) 31, ongle 19, pouce (sans ongle) 14, ongle 15 mm.

♀. Long. tot. 370, " enverg. 930," aile 260, queue 140, bec 28, tarse 47, doigt médian (sans ongle) 33, ongle 20, pouce (sans ongle) 16, ongle 16·5 mm.

Un exemplaire de Tarapoto, Pérou septentrional-oriental, paraît un peu intermédiaire. En tout cas il faudra examiner plusieurs oiseaux avant de déclarer qu'il s'agissait d'une forme constamment plus petite de l'occident.

## 55. SPEOTYTO CUNICULARIA (Molina).

*Pholeoptynx cunicularia*, Tacz. Orn. du Pérou, i. p. 174.

Lima : quatre exemplaires de septembre et octobre 1889. " Iris jaune."

Ce serait peut-être la forme de l'Amérique du nord *S. hypogæa*, Bp., à laquelle il faudra rapprocher les oiseaux de Lima et de la vallée du Rio Tambo<sup>2</sup>. Ils sont plus petits que les oiseaux du Chili et ont le plumage plus noirâtre, moins mélangé de roussâtre, et le visage plus blanchâtre. En outre le style de coloration est plus d'accord avec la forme du Chili (*cunicularia* typique) qu'avec celui de l'orient (*grallaria*, Spix). Les bandes de l'abdomen sont très-bien marquées (pas déliées en taches), les bandes noirâtres sur les barbes internes des remiges et sur les rectrices externes également

<sup>1</sup> *Strix mexicana*, Gml. (ex Briss., ex Hernandez), est fondé sur une description tellement insuffisante qu'il paraît impossible de dire avec certitude à quelle espèce elle se rapporte. Mais c'est plus probablement le *Bubo virginianus* que M. Hernandez a indiqué sous le nom de Tecolotl. Par conséquence il faudra changer le nom de l'espèce d'*Asio* nommée généralement "*mexicana*," dont la dénomination la plus ancienne paraît être *Bubo clamator*, Vieill. Ois. de l'Am. Sept. (1807), p. 52, pl. 20, qui est évidemment fondé sur des oiseaux de Cayenne.—BERL. et SROLZM.

<sup>2</sup> Voir Sharpe, Cat. B. ii. pp. 144, 147.

bien marquées et presque aussi larges que les intervalles blanches. Il y a cinq bandes étroites blanchâtres sur les rectrices médianes.

Malheureusement nous n'avons pas des oiseaux des États Unis pour comparer. En cas que les oiseaux de Lima seront différents on pourrait les séparer comme *S. cunicularia nanodes*, subsp. nov.

♂. Aile 168, queue 80, bec 23, tarse 41 mm.  
♀. „ 169-164, „ 83-77, „ 21-16½, „ 40 „

56. *GLAUCIDIUM PHALENOÏDES* (Daud.).

*Glaucidium ferrov*, Tacz. Orn. du Pérou, i. p. 178.

Lima: septembre à novembre 1889. Ica: novembre et décembre 1889. Six exemplaires. "Iris jaune-orangée."

Nous n'avons pas encore décidé à quelle race locale il faudra rapprocher les oiseaux de Lima.

Fam. FALCONIDÆ.

57. *ANTENOR UNICINCTUS* (Temm.).

*Urubitinga unicincta*, Tacz. Orn. du Pérou, i. p. 106.

Lima (octobre) et Ica (décembre) 1889: deux exemplaires. "Iris chez le mâle adulte brune claire, chez la femelle jeune brun-rougeâtre claire."

58. *GERANOÆTUS MELANOLEUCUS* (Vieill.).

Lima: trois exemplaires d'octobre et novembre 1889 et de janvier 1890. "Iris brune claire."

59. *FALCO CASSINI*, Sharpe.

Lima: un mâle du 4 mars 1890. "Iris brune foncée."

60. *TINNUNCULUS SPARVERIUS CINNAMOMINUS* (Sws.).

*Cerchneis cinnamomina*, Tacz. Orn. du Pérou, i. p. 154.

Lima et Ica: cinq exemplaires d'octobre à décembre 1889. "Iris brune foncée."

Un mâle adulte examiné par Berlepsch s'accorde tout-à-fait avec un mâle adulte de Chota, Pérou du nord; il a néanmoins les ailes, la queue et le bec plus courtes. Nous n'avons pas pu comparer des oiseaux typiques du Chili.

Fam. VULTURIDÆ.

61. *CATHARTES ATRATUS* (Bartr.).

*Catharistes atratus*, Tacz. Orn. du Pérou, i. p. 84.

Ica: deux exemplaires de décembre 1889. "Iris brune."

62. *CATHARTES AURA PERNIGER* (Sharpe).

*Ænops pernigra*, Tacz. Orn. du Pérou, i. p. 89.

Lima: novembre 1889 et janvier 1890. }  
Ica: décembre 1889. } Quatre exemplaires.