

# SOBRE UNA SUBESPECIE DE *ATHENE CUNICULARIS* DE ARGENTINA (*AVES STRIGIDAE*)

Por C. C. OLROG (1)

La lechuza de las vizcacheras, *Athene* (\*) *cunicularia* Molina es de amplia dispersión desde el Sur de Canadá hasta Tierra del Fuego, con no menos de 17 subespecies, de las cuales 8 corresponden a las islas del Caribe y del Pacífico; 7 a las zonas aisladas del continente sudamericano, de las cuales *A. c. juninensis* Berlepsch & Solzmann, 1902 se registra para la Alta Cordillera de los Andes y otras 2 especies son de amplia distribución, *A. c. hypogaea* Bonaparte, 1825, de Norte y Centroamérica y una de Sudamérica austral (Chile, Bolivia, Oeste de Paraguay, Argentina y Uruguay) que por tradición ha sido nominada simplemente *A. cunicularia* Molina.

La taxonomía de las lechuzas es, desde ya, complicada debido a la gran variación individual, de modo que es difícil hallar caracteres constantes, excepto la talla.

En el caso de *A. cunicularia*, el extinto ornitólogo W. Partridge, desde 15 años atrás, estimaba que la población que habita Argentina se diferenciaba por un carácter visible del ala y por lo tanto necesitábase un nombre nuevo para designarla, que lamentablemente no tuvo oportunidad de darle. Por lo tanto, al confeccionar una nueva lista de la avifauna argentina, dedicamos esta subespecie a la memoria de William Partridge.

## *Athene cunicularia partridgei* ssp. nov.

Tipo Nº 04956 de la Colección Ornitológica del Instituto - Fundación Miguel Lillo. Hembra adulta procedente de Ituzaingo, provincia de Corrientes, Argentina, oct. 22 1947 S. A. Pierotti.

Similar a las distintas poblaciones de *A. cunicularia* y principalmente a la chilena, de la que se distingue por la porción ancha blanca del vexillo interior de las secundarias, carácter constante en el material estudiado del norte y centro argentino incluyendo ejemplares de las siguientes provincias: Buenos Aires, 12; Catamarca, 6; Córdoba, 5; Corrientes, 6; Entre Ríos, 2; Formosa, 5; Jujuy, 4;


---

(\*) *Speotyto* se incluye en *Athene* (Mayr & Short, 1970, *Spec. Tax. N. Am. Birds* 51-52).

(1) Instituto Miguel Lillo, Tucumán.

La Rioja, 4; Salta, 9; Santa Fe, 4; Santiago del Estero, 7; Tucumán, 21. Material comparativo: *A. c. cunicularia*, Chile, 12; *A. c. grallaria*, Misiones, 5.

SUMMARY. — About a subspecies of *Athene cunicularia* from Argentine the difference between the Argentine and Chilean populations was pointed out by the late William Partridge, but he never proposed a name; the nearly pure white inner web of the secondaries distinguish the Argentine subspecies.



Secundaria típica de: 1, *Athene c. cunicularia*; 2, *Athene c. partridgei*.