

ными поперечными, рыжими полосками на каждомъ перѣ: слѣд. цвѣторасположеніе сходно, но у нормальныхъ *F. aesalon* сѣро-буроватый цвѣтъ преобладаетъ надъ рыжимъ, у *F. alaudarius* наоборотъ.

Самецъ *F. alaudarius*, добытый зимой 1866 у Чимкента, нѣсколько сѣрѣе самки; наствольныя пятна на груди немного шире; вообще цвѣтъ ближе къ молодымъ *F. aesalon*, но ростъ малъ. Длина 12 " 3", размахъ 24 " 7"; длина молодаго *F. aesalon*, самца 13", размахъ 24 " 6".

По этимъ даннымъ еще нельзя рѣшить, есть ли *F. alaudarius* особый видъ, или видоизмѣненіе *F. aesalon*; нужно болѣе экземпляровъ, во всѣхъ возрастахъ, тѣмъ болѣе что мои экземпляры къ сожалѣнію добыты не при мѣ, такъ что я не могъ опредѣлить ихъ возраста посредствомъ вскрытія и осмотра зрѣлости половыхъ органовъ. Вѣроятно впрочемъ къ этому же виду или видоизмѣненію относится малорослый *F. aesalon*, старый самецъ, добытый на Иртышѣ 16-го апрѣля 1864 г., при весеннемъ пролетѣ: длина 12" 1", размахъ 25", крыло 8" 5", хвостъ 5", плюсно 13", средний палецъ 14", клювъ 7". Относительно цвѣта отличается рыжимъ затылкомъ, съ бѣловатыми концами перьевъ, очень мелкими наствольными пятнами на груди и брюхѣ и рыжими ободками всѣхъ голубовато-пепельныхъ перьевъ головы, спины, плечъ и кроющихъ крыло; рулевые съ ясными черноватыми поперечными полосками.

33. 34. *Strigiceps cyaneus* и *S. pallidus*. Приводимые орнитологами отличительные признаки этихъ двухъ, весьма близкихъ видовъ я нашелъ вообще непостоянными, кромѣ различій во второй одеждѣ самцовъ; почему долго считалъ ихъ за видоизмѣненія, какъ объяснено въ моемъ трудѣ о періодическихъ явленіяхъ животной жизни въ Воронежской губерніи. Однако, при внимательномъ сравнительномъ изученіи многихъ десятковъ экземпляровъ всякаго возраста и пола, я наконецъ нашелъ безошибочный отличительный признакъ, именно цвѣтъ надхвостья. *)

У *S. cyaneus* оно бѣлое безъ пятенъ, или съ нижними наствольными полосками.

У *S. pallidus* оно тоже бѣлое но, кромѣ весьма ясныхъ наствольныхъ полосъ, есть еще темныя поперечныя, широкія и рѣзкія, сѣрыя у взрослыхъ самцовъ, бурныя у самокъ и молодыхъ.

Этотъ признакъ отличителенъ для обоихъ половъ и всѣхъ возрастовъ.

35. *Athene orientalis* отъ европейской *A. noctua* отличается тѣмъ, что бурый цвѣтъ послѣдней у *A.*

orientalis гораздо блѣднѣе, переходитъ въ сѣро-рыжеватый съ желтоватымъ оттѣнкомъ какъ *A. noctua meridionalis*, отъ которой *A. orientalis* отличается густымъ опереніемъ пальцевъ, кромѣ ногтевого сустава. Пальцы оперены также густо, какъ у *A. (Nyctale) Tengmalmi*, но кромѣ своего темнаго цвѣта, *A. Tengmalmi* отличается ушными отверстиями, полулунными и широкими, во всю вышину черепа, между тѣмъ какъ у *A. orientalis* ушное отверстіе овально и гораздо меньше, въ пол-черепа, какъ у *A. noctua*. По Киргизски *A. orientalis ай-хай*, по крику; тоже *бай-кызъ* (богатая дѣвица).

По соединенію этихъ признаковъ, свѣтлаго цвѣта съ пушистыми пальцами, *A. orientalis* я считаю не видоизмѣненіемъ, а особымъ видомъ.

46. *Corvus subcorax* (*C. umbrinus*? Rüpp., var.? *) Форма совершенно, какъ у *C. corax*, и такой же округленный хвостъ, котораго крайнія перья на 1—1½" короче среднихъ; клювъ и голова пропорціонально немного меньше, однако гораздо крупнѣе, чѣмъ у *C. corone*, къ которой *C. subcorax* приближается ростомъ, но крикъ почти какъ у ворона, отрывистый, а не протяжный; только голосъ не такъ басистъ; наконецъ, длинныя заостренныя горловые перья начинаются отъ самаго клюва, какъ у ворона и постепенно удлиняются къ низу; у вороны длинныя узкія, заостренныя перья съ половины горла внизъ. Длина *C. subcorax* 23", 2, " размахъ 42", клювъ 2" 5"—2" 7", хвостъ 9½".

Длина *C. corone* 21—22", размахъ 39—42", клювъ 2" 2"—2" 5" хвостъ 8¼—1½".

Длина *C. corax* 26—29", размахъ 51—55", клювъ 3—3½", хвостъ 10" 4"—11".

Иные экземпляры *C. corone* приближаются къ *C. subcorax*, то крупнымъ клювомъ, то округленнымъ хвостомъ, котораго крайнія перья бываютъ на 1" короче среднихъ. Но даже при равныхъ размѣрахъ клювъ *C. corone* всегда тоньше, болѣе коническій, и верхняя челюсть не такъ выпукла, какъ у *C. subcorax*, притомъ безошибочный признакъ даютъ горловые перья. Отъ *C. corax* достаточно отличается *C. subcorax* уже своимъ малымъ ростомъ.

Относительная длина переднихъ маховыхъ перьевъ (напр. 3 > 4 > 5 > 2 > 6 и т. д.) и число щитковъ на плюснѣ, въ чемъ я было искалъ отличительныхъ признаковъ для этихъ трехъ, одинаково черныхъ видовъ, у всѣхъ ихъ непостоянны.

61. *Passer ammodendri*, nov. Клювъ пропорціонально меньше чѣмъ у прочихъ воробьевъ, выпуклый; поз-

*) Также постоянны въ сущности и признаки маховыхъ, указанные Блэзиусомъ, особенно ихъ выемки, но относительная длина маховыхъ осенью неясна, когда есть нѣсколько недоросшихъ перья, хотя уже начинающія твердѣть. Тогда *S. pallidus* можетъ показаться такимъ же тупокрылымъ какъ *S. cyaneus*.

*) У африканскаго *C. umbrinus* голова, шея и многія перья брюха не черныя, а блестяще-темнобурныя; впрочемъ въ жаркое лѣто 1860 г. я замѣтилъ на нижнемъ Уралѣ побурѣвшія черныя перья и у нашихъ галокъ, и притомъ перья свѣжія. Но хвостъ *C. umbrinus* много короче: 8 англ. д.