

ЗАПИСКИ
ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА
ПО ОБЩЕЙ ГЕОГРАФІИ.
ТОМЪ ХІІ, № 2,
изданный подъ редакціею д. чл. Ѳ. Н. ЧЕРНЫШЕВА и д. чл. А. П. ГЕРАСИМОВА.

МАТЕРІАЛЫ
для
ОРНИТОФАУНЫ
СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Б. М. ЖИТКОВЪ и С. А. БУТУРЛИНЪ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин., 28.
1906

Athene noctua Retz.

Strix noctua Retz. Эверсманнъ. Ест. ист. Оренб. кр., III, стр. 90. *Athene noctua* (Boie) Retz. М. Богдановъ. Пт. и зв. Пов., стр. 55. *Athene noctua*. М. Рузскій. Орнит. набл. въ Симб. губ., стр. 9. *Athene noctua* Scop. М. Мензбиръ. Пт. Росс., II, стр. 262.

Домовый сычъ въ Симбирской губерніи встрѣчается въ селеніяхъ и лѣсной, и степной полосы, но всюду не часто. Въ степяхъ Курмышскаго уѣзда онъ, кажется, болѣе обыкновененъ, нежели въ лѣсистой мѣстности по Алатырю. Мы имѣемъ также экземпляръ изъ долины Суры. М. Н. Богдановъ говоритъ, что на широтѣ Саратова сычъ этотъ зимуетъ. М. Д. Рузскій указываетъ (Мат. къ изуч. птицъ Казанской губ., стр. 165), что изъ Симбирской губерніи форма эта улетаетъ на зиму. Много лѣтъ тому назадъ одному изъ авторовъ этой работы случилось застрѣлить сыча глубокой зимой на гумнѣ деревни въ долинѣ Алатыря. Но мы не можемъ рѣшить теперь, не былъ ли это мохноногій сычъ (*Nyctale tengmalmi* Gm.), котораго позже намъ уже не приходилось встрѣчать въ описанной нами мѣстности. Мы замѣтимъ здѣсь же, что намъ не удалось найти въ Симбирской губерніи и воробьиного сычика (*Glaucidium passerinum* L.), который встрѣчается здѣсь по словамъ Эверсманна и М. Д. Рузскаго (Орнит. набл., стр. 7).

Bubo bubo L.

Strix bubo L. Эверсманнъ. Ест. ист. Оренб. кр., III, 76. *Bubo maximus* Retz. М. Богдановъ. Птицы и зв. Поволжья, стр. 59. *Bubo ignavus*. М. Рузскій. Орнит. набл., стр. 4. *Bubo maximus* Ger. М. А. Мензбиръ. Пт. Росс., III, 269.

Во всѣхъ большихъ лѣсахъ Симбирской губерніи филинъ—обыкновенная птица. Въ хвойныхъ и смѣшанныхъ лѣсахъ долины Алатыря весной и осенью очень часто приходится слышать крикъ этой птицы. Еще многочисленнѣе филины въ

юго-западномъ углу Ардатовскаго уѣзда, въ лиственныхъ удѣльныхъ дачахъ близъ селъ Сырятина и Маресева. Здѣсь и болѣе обширные участки удѣльныхъ лѣсовъ, и небольшія частновладѣльческія рощи, расположенныя частью по холмистой грядѣ, вдоль которой проходитъ Московско-Казанская жел. дорога, изобилуютъ глухими оврагами, въ которыхъ и гнѣздятся филины. Въ лиственныхъ рощахъ степной полосы къ сѣверу отъ долины Алатыря филинъ встрѣчается гораздо рѣже, въ степныхъ же оврагахъ или балкахъ не встрѣченъ нами ни разу. Въ лѣсахъ долины Суры форма эта обыкновенна.

Крикъ филина связанъ со временемъ размноженія и раздается всего чаще и громче въ апрѣлѣ и маѣ мѣсяцахъ. Обыкновенно филинъ начинаетъ кричать сейчасъ же послѣ захода солнца и замолкаетъ глубокой ночью. Но нерѣдко крикъ приходится слышать и до заката солнца. Съ наступленіемъ поздней весны филинъ замолкаетъ и начинаетъ снова кричать въ августѣ, вѣроятно, подъ вліяніемъ просыпающагося временно полового возбужденія. Среди лѣта или зимою намъ лично никогда не приходилось слышать крикъ филина.

Летая и охотясь обыкновенно въ сумерки и ночью, филинъ въ то же время вовсе не боится дневного свѣта. Вспугнутый днемъ, онъ совершенно свободно лавируетъ въ лѣсу. По своей охотѣ онъ и днемъ иногда вылетаетъ изъ чащи лѣса на поляны и опушки, садится иногда лѣтомъ на стога и т. под. Намъ извѣстенъ также случай, когда въ Ардатовскомъ уѣздѣ зимой среди дня филинъ былъ убитъ на только что схваченномъ имъ бѣлякѣ.

Восточно-русскій филинъ отличается очень замѣтно по своему гораздо болѣе свѣтлому цвѣту отъ типичнаго западноевропейскаго *Bubo bubo*. Въ то же время онъ довольно рѣзко отличенъ и отъ *B. bubo sibiricus* съ его бѣловатой окраской и отъ *B. bubo turcomanus* съ его ярко-охристымъ внѣшнимъ

краемъ плечевой птерилии и окаймленными съ обоихъ краевъ охристымъ ушными пучками. Быть можетъ, восточно-русскій филинъ заслуживалъ бы выдѣленія въ особую географическую разновидность подъ названіемъ *B. bubo ruthenus*, связанную, конечно, переходами съ западными и сибирскими формами.

Зорьки (*Ephialtes scops* L.) мы не встрѣчали въ Симбирской губерніи. М. Д. Ружскій приводитъ этотъ видъ для долины Суры (Орнит. наблюденія, стр. 13).

Surnia ulula L.

Strix funerea Lath. Эверсманнъ. Ест. ист. Оренб. кр., III, 83. *Surnia nisoria* (Dum.) L. М. Н. Богдановъ. Пт. и зв. Пов., стр. 54. *Surnia ulula*. Ружскій. Орнит. набл., стр. 7. *Surnia ulula* L. Мензбиръ. Пт. Росс., II, 284.

Въ коллекціи нашей есть экземпляръ ястребиной совы (♀), убитый 31/III близъ Промзина. Очень рѣдко попадаетъ зимой въ лѣсахъ долины Алатыря. Въ другія времена года мы этого вида не встрѣчали.

Surnia nyctea L.

Strix nyctea L. Эверсманнъ. Ест. ист. Оренб. кр., III, 74. *Surnia nyctea* (Dum) L. Богдановъ. Пт. и зв. Пов., стр. 54. *Nyctea nivea* L. Мензбиръ. Пт. Росс., II, 307.

Полярная сова изрѣдка появляется зимой въ степной полосѣ Симбирской губерніи къ сѣверу отъ лѣсовъ долины Алатыря. Она всегда очень рѣдка, а въ нѣкоторые годы, какъ кажется, не прилетаетъ вовсе. Въ лѣсистыхъ мѣстностяхъ губерніи мы не видѣли этой птицы. Она появляется обыкновенно глубокой зимой и встрѣчается болѣе часто сѣвернѣе описаннаго края, — въ степной полосѣ Нижегородской губерніи до Волги (Сергачскій, Княгининскій, Васильсурскій уѣзды).