

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ
ВИДОВ ПТИЦ СССР, ИХ ПОДВИДЫ,
РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ПОЛЬЗА И ВРЕД
ДЛЯ ХОЗЯЙСТВА

ВЫПУСК ПЕРВЫЙ

ДНЕВНЫЕ ХИЩНИКИ
И
СОВЫ СССР

С 104 рисунками и 1 цветной таблицей окрасок
художника Н. Н. Куракина



КНИГОСОЮЗ - 1928

(булано) охристый; подбой крыла и подмышечные с примесью белого; передняя часть груди почти без поперечного рисунка.

в) Малоазийский филин *B. b. interpositus* Rothsch. et Hart. (Бубо бубо интерпозитус) распространен от северного Кавказа до Палестины; (? и нижней Волги), настолько похож по общей окраске на русского филина, что описавшие его в 1910 г. Ротшильд и Хартерт затем соединили с предшествующей формой; отличается однако более резким поперечным рисунком зашейка, большею темною примесью на испode крыла.

г) Крымский филин *B. b. tauricus* But. (Б. б. таурикус), гнездящийся в Крыму (тип настоящего описания—самец от 24 августа 1914 г. из Кача Актаци, коллекция М. П. Розанова), также очень близок к обоим предшествующим, но задняя часть темени и передняя часть затылка с преобладанием охристого цвета над чернотой, лицевой диск скорее охристый, чем серый, перья рожок с очень широким охристым внутренним краем; область крупных темных пятен занимает менее 0,5 нижней стороны тела.

д) Сибирский филин *B. b. scandiacus* (L.) (*B. sibirica* Glog.) (Б. б. скандиакус) населяет зап. ч. Сибири от верхов, р. Урала до зап. ч. Томского края, Тобольска, зимою кочуя до Волги, Аральского моря и Семиречья, изредка залетая и в сев.-зап. Европу; огромная птица—крыло 45—53, хвост 23—31 см; легко узнается по общей беловатой окраске: общий фон сливочно-беловатый с очень узкими темными пятнами, так что даже у молодых, более охристых птиц в мантии бурый цвет не преобладает над бледным; грудь и испод крыла без ясно обозначенного поперечного рисунка.

е) Туркестанский филин *B. b. tarcomanus* Ev. (Б. б. туркоманус) также легко отличается от всех других: не мелкий—крыло $42\frac{1}{2}$ —48,5, хвост 22—27 см; но клюв и лапы слабые, коготь среднего пальца по прямой обыкновенно 2,7—3,3 (у других обыкновенно 3,3—4,1), клюв от восковицы обыкновенно 2,6—3,1 (у других подвидов около 3,1—3,8) и высота клюва перед восковицей около 2—2,5 г (вместо $\frac{2}{5}$ —3,25 см; общая окраска светлая, охристо-желтая, включая и оперение ног (не испещренных бурым) и подхвостье; мантия с преобладанием светлой окраски над бурой, так как бурые пятна узкие, ширина их заметно меньше длины; подмышечные беловатые с буроватыми пестринками; пояс темных пятен на груди узкий—около 0,25 нижней стороны; темные поперечины хвостовых перьев очень узки: на внутреннем опахале 3-го махового снизу видно 3 или 4 темных поперечных полосы (как у сибирского филина, а у русского, крымского и малоазийского—от 5 до 7); гнездится от Каспийского моря до вост. Тянь-Шане (и Цайдама?) и от вост. Персии, Белючистана и сев.-зап. Индии до Тарбагатай.

ж) Таримский филин *B. b. larimensis* But. (Б. б. таримензис) очень близок к предшествующему, но отличается тем, что темя и затылок более охристы за счет сокращения бурых пестрин, мелкие кроющие предплечья почти сплошь чисто-желтые (у предшествующего и темя, и эти кроющие со значительным преобладанием бурого); щит зашейка еще желтее, так как бурые пятна здесь всего около 3— $4\frac{1}{2}$ мм ширины вместо 5—7 мм; подмышечные сливочно-белые без пестрин; тип настоящего описания—февральский самец с Лоб—Нора от Н. М. Пржевальского, в зоол. музее 1-го Гос. Москов. Универс. Обитает бассейн Тарима и вероятно сюда же относятся птицы из Цайдама (во всяком случае последние—не *tibetanus* Bianchi).

з) Енисейский филин *B. b. yenseensis* But. (Б. б. енисейензис) обитает область сред. и частью верх. течения Енисея и Алтай; легко отличается и от сибирского, и от туркестанского филинов, так как в мантии у него преобладает бурый цвет над светлыми частями оперенья и у темно-бурых пятен мантии ширина не уступает длине; нижняя сторона в общем светло-серовато-охристого, а не сливочно-белого и не чистого желто-охристого цвета; грудь, брюхо и подмышечные с резким поперечным темным рисунком; оперенье ног сливочно-белое с бурыми пестринками на плюснах; щит зашейка чистый охристо-желтый с бурыми наствольями около 5—6,5 мм ширины и с ясными следами—но только следами—поперечного рисунка; темные поперечины рулей очень узки, а промежутки между ними довольно чистые.