

de notre *Philépitte* ayant ses plumes mates, sans reflet, en un mot à l'état ordinaire.

Mais un caractère saillant chez la *Ph. sericea*, celui de la présence d'une caroncule membraneuse au-dessus de l'œil, manque complètement dans notre espèce, qui a le tour de l'œil entièrement emplumé comme le reste de la tête.

Or, l'absence de ce caractère, déclaré au surplus par M. Isid. Geoffroy-Saint-Hilaire (dans sa précieuse notice insérée au Magasin de zoologie de 1839) être de valeur plutôt spécifique que générique, ne saurait en aucune manière infirmer en quoi que ce soit le classement que nous faisons de cette espèce dans le genre *Philepitta*; elle vient, au contraire, réaliser les prévisions du célèbre zoologiste, qui s'exprimait ainsi : « D'autres espèces » de *Philépitte*s, les jeunes sujets, peut-être même les femelles » de l'espèce dès à présent connue, peuvent très-bien ne présenter aucune trace de caroncule. »

Nous ne savons rien des mœurs de cette espèce qui a été découverte par M. Goudot à Madagascar, et donnée par lui au Muséum d'histoire naturelle de Paris qui en possède deux individus exactement semblables.

oiseaux d'abyssinie.

BUBO DILLONII. *B. supra brunneo-nigrescente; fulvo-albido tenuissime ocellato; regione ophthalmica et tectricibus alarum brunneis, albo marmoratis; subtus, gula et gutture niveis, collare nigro cinctis; pectore nigro, fulvo vermiculato, remigibus rectricibusque brunneis fulvo fasciatis; abdomine brunneo-nigrescente albo maculato; lateribus pedibusque fulvis.*

H. in Abyssinia. — Long., 47 cent.

Nous avons dédié cette espèce, que nous croyons nouvelle et qui fait partie des envois de Petit et de Quartin Dillon, à la mémoire de ce dernier, pour qu'il reste au moins trace de son passage dans la science à laquelle il était tout dévoué.

Le même sentiment nous a dirigé pour la dédicace des deux espèces suivantes, provenant de la même expédition.

LOXIA (Euplectes) PETITI. *L. fronte, capite, gutture, collo pectoreque ac crisso igneo colore rubescentibus: scapulo fulvo.*

loro, gula et abdomine nigerrimis; alis, remigibus reetricibusque dilutioribus, fulvo tenuissime limbatis; tetricibus caudæ superioribus non elongatis, neque setosis.

Habit. in Abyssinia, ad ripas Tigrinas. — Long., 13 cent.

A de grands rapports avec *Euplectes rufo-velatus* de Fraser. Procéd. zool., S. 1842, p. 142, mais en diffère par l'absence de noir au front, par le fauve du manteau et par le roux de la région inférieure du dos.

MEROPS LEFEBVRII. *M. fronte, supercilio et torque collari indigotino splendide cœruleis; capite, collo postico, dorso, alis reetricibusque duabus intermediis læte viridibus; remigibus secundariis reetricibusque 4-lateralibus fusco, a stipite, nigroque, ad apicem semi-partitis; his albo limbatis; infra, gula et gutture junquillaceo flavis; striga nigra ab oculis usque ad aures ducta, nota alba subterminata; pectore rufo fuliginoso; abdomine et crisso rufo-viridi flavescens; rostro nigro, pedibus sordide carnis; oculis rubris.*

Habit. in Abyssinia, provincia Chirensi. — Long., 20 cent.

Cette belle espèce, que nous croyons nouvelle, est nommée sur le dessin et dans l'album du docteur Petit, *Guépier à collier d'azur*.

Ce pourrait bien être le mâle adulte du *M. Lafresnayi* (Guér. Mén. Rev. zool. 1843, p. 322). Dans ce cas, le nom qui précède s'effacerait devant la priorité de celui-ci.

DESCRIPTION d'une autre espèce nouvelle de Guépier; par MM. O. DES MURS et PUCHERAN.

MEROPS NUBICOIDES. — *Fronte ac capite viridi-olivaceo metallice splendentibus; striga post-oculari nigra; suprâ: brunneo rubracco; remigibus secundariis reetricibusque cinereo marginatis, nigro ad apicem limbatis; tetricibus alarum majoribus virescentibus; infra: gula roseo lætè carminata; pectore et abdomine flavo levissime rubescentibus; uropygio crissoque ex ærugine-viridi cœrulescentibus; cauda subforcipata.*

Longit.	34 cent.
— reetric. later.	28
— mediar.	19