

I. TRAVAUX INÉDITS.

OISEAUX NOUVEAUX découverts par MM. FERRET et GALINIER pendant leur voyage en Abyssinie. Décrits par M. GUÉRIN-MÈNEVILLE.

Nous avons déjà publié les diagnoses de quelques-unes des espèces découvertes par ces voyageurs (p. 161); une étude plus approfondie nous en a fait reconnaître quelques autres que nous nous empressons de décrire ici.

Bubo cinerascens. Supra fusco-cinereus, albo parce vermiculatus et variegatus; alarum tectricibus majoribus et scapulariis maculis magnis albis notatis; facie pallide cinerea, ante oculos alba et post genas circuitu brevi nigro circumdata; gutture albo, semicollare fusco, maculis parvis rotundatis variegato, et infra plaga jugulari alba; pectore totoque abdomine albescentibus, rufescenti-griseo subtiliter vermiculatis, striisque crebris irregularibus fasciatis; remigibus rectricibusque vittis latis fuscis et griseo-albidis fasciatis.

Cette petite espèce, du genre *Bubo*, rappelle assez par sa coloration, mais dans une proportion beaucoup moindre, le *Hibou lacté* de Temminck, (planches coloriées) et comme lui habitant de l'Afrique, mais de l'Afrique occidentale.

Otus abyssinicus. Supra fusco-brunneus, capite maculis parvis pallide fulvis notato; dorso parce ejusdem coloris vermiculato; alis maculis majoribus fulvis et albis variegatis; pectore guttureque pallide ochraceis et fusco nebulosis, facie subflavâ brunneo variegata, circulo sordide albescente nigro terminato circumdata, illius circuitu externo contiguo, maculis parvis pallidis et fuscis variegato; abdomine pallide ochraceo, maculis albis quadratis vittis longitudinalibus et transversis nigro-fuscis circumdatis, notato; femoribus tibiisque pallide stramineis.

Ploceus melanotis. Supra viridi-olivaceus, alis fuscis, primariis anguste olivaceo, secundariis et tectricibus late flavo-albicante marginatis. Fronte usque ad verticem; gutture, collo an-