

qui manque chez les oiseaux de l'Ecuadeur. Les derniers ont la poitrine plus fortement lavée de bleuâtre, sont généralement plus obscurs et moins forts dans toutes les dimensions.

PSITTACIDÆ.

*162. PIONUS CORALLINUS, Bp.

Deux mâles et une femelle recueillis par Stolzmann à Pedregal en février. Iris brun foncé.

*163. PIONUS SENILOIDES (Mass. et Souancé).

Une femelle tuée par Stolzmann à Cayendeled en février. Iris brun foncé.

STRIGIDÆ.

*164. BUBO NIGRESCENS, Berl.

B. virginiano ex America sept. et centr. proximus, sed differt colore supra subtusque nigrescentiore, minus rufescente, plumarum basibus ardesiacis (nec fulvis), tarsis fere unicoloribus sordide albis (nec fulvis fusco fasciatis), maculis albis apicalibus tectricum alarum superiorum fasciisque externis scapularium fere pure albis.

Tout le dessus du corps d'un brun noirâtre, varié de petites macules irrégulières d'un fauve pâle ou blanchâtre, disposées en bandes séparées (deux ou trois de chaque côté de la plume); la base des plumes en dessus et en dessous du corps est d'un ardoisé noirâtre (largement d'un fauve roussâtre chez le *virginianus*). Sommet de la tête presque uniforme sans maculature; les huppées également noirâtres avec une faible maculature ou une bordure blanchâtre au bord interne des plumes; les plumes basales du bec, la partie antérieure des tectrices auriculaires, le menton et une grande région jugulaire d'un blanc pur; les plumes des freins ont les baguettes noires, et quelques-unes au voisinage de l'œil sont noires en entier; la région oculaire et sourcilière mélangée de noirâtre et d'un blanc roussâtre; tectrices auriculaires antérieures terminées largement d'une bordure noire formant un croissant noir très distinct sur chacun des côtés de la tête; les tectrices postérieures mélangées de blanc et de noirâtre. Gorge bordée en dessous d'une bande étroite de plumes obscures avec une maculature fauve; les côtés du cou, le bord supérieur et les côtés de la poitrine ont la même coloration que le dos; sur la poitrine inférieure les raies blanches sont plus grosses et plus distinctes, formant des bandes régulières sur les plumes; ces bandes blanches deviennent sur l'abdomen encore plus larges, de sorte qu'on pourrait nommer les plumes blanches rayées régulièrement de bandes noirâtres (5-7 sur chaque plume, plus étroites que les intervalles blanchâtres, séparées du noirâtre par une ligne fauve); la région anale, les flancs internes et les sous-caudales variés d'une manière semblable au ventre, mais d'une teinte générale plus roussâtre. Les plumes des tibias d'un fauve blanchâtre avec une petite maculature obscure peu visible; les plumes du tarse d'un

blanc sale uniforme, sans taches. Remiges et rectrices d'un brun noirâtre comme le dos, traversées de bandes d'un brun grisâtre mélangé de roussâtre et de blanchâtre, ondulé et moucheté de noirâtre. Sur la barbe interne des remiges et des rectrices, excepté les deux médianes, ces bandes sont plus larges, et d'une couleur fauve presque en entier mélangée de noirâtre. Les rectrices terminées largement à peu près sur 18-20 millimètres, d'un blanc roussâtre presque uniforme, excepté les deux médianes, qui ont l'extrémité mélangée de blanc et de noirâtre; il y a 6 bandes claires sur les rectrices qui paraissent être d'un blanc roussâtre uniforme sur la page inférieure et y présentent la même largeur que les bandes noirâtres. Tectrices supérieures de la queue noirâtres barrées et ondulées irrégulièrement de blanc roussâtre. Les petites tectrices supérieures de l'avant bras sont d'un noirâtre peu varié de roussâtre; celles des remiges primaires et de l'aile batarde noirâtres avec une ou deux larges bandes d'un fauve clair sur la barbe interne; les moyennes et les grandes noirâtres mélangées de blanc roussâtre, les antérieures présentant une grosse tache d'un blanc presque pur sur l'extrémité de la barbe externe, mouchetée un peu de noirâtre en arrière; les scapulaires externes ont aussi quelques taches blanchâtres, mais variés plus de roussâtre en dehors; les sous-alaires antérieures barrées de noirâtre et de fauve, les postérieures blanches mélangées de noirâtre. Trois bandes claires sur la page inférieure de la première remige. Bec noirâtre, à extrémité pâle; iris jaune.

Long. totale 460, aile 350, queue 185, bec (culmen) $30\frac{1}{2}$, tarse 80 mm.

Une femelle de Cechce (10,000 pieds) prise par Siemiradzki en juillet.

Au premier coup d'œil on est tenté de prendre cet oiseau pour une variété nègre, comme on a souvent des exemples dans la classe des rapaces; mais comme M. Sharpe, dans le Catalogue des Striges (p. 23), parle d'un oiseau pareil, provenant aussi de l'Équateur, du Musée Salvin et Godman, nous nous croyons être justifiés de l'opinion que cette curieuse coloration peut être constante et propre à une forme de *Bubo* habitant les montagnes de l'Équateur occidental, et non encore reconnue.

*165. MICRASTUR GUERRILLA, Cass.

Une femelle de Surupata prise par Siemiradzki le 24 janvier. Iris brun grisâtre; parties nues de la tête et pattes jaunes.

Long. de l'aile 172, queue 165, bec (culmen) $17\frac{1}{4}$, tarse 58 mm.

Le doigt externe sensiblement plus long que l'interne.

Cet oiseau diffère de deux oiseaux adultes du *M. guerilla*, provenant de Guatemala (Musée Berlepsch), par le plumage généralement plus obscur. Tête, dos et les ailes à l'extérieur sont d'un ardoisé brunâtre uniforme, tandis que chez les oiseaux de Guatemala le dos et la tête sont d'un ardoisé un peu plus clair, les ailes d'un brun chocolat un peu roussâtre. En dessous la différence est encore plus frappante, car les raies noirâtres sont plus larges et plus rapprochées entre elles, les blanchâtres plus étroites et fines sur la poitrine, ce