

- Brachyo-** 17. St. auricularum penna brevi, corpore supra fusco, pennis
tos. margine flavis, subtus pallide flavo, longitudinaliter
striato. *Forster ad. angl. LXII. p. 384. n. 2.*
Short-eared Owl. *Brit. zool. n. 66. t. 31. Arct. zool. 2.
p. 229. n. 116. Lath. syn. I. 1. p. 124. n. 9.*
Chouette ou grande Chevêche. *Buff. hist. nat. des ois. I.
p. 372. t. 27. pl. enlum. n. 438.*
**Habitat in America & Europa, potissimum boreali, Sibiria,
14 pollices longa, muribus yiditans, quibus invigilat,
audax. Cauda obscure fusca; rectrices intermediae
circulo flavo.**
- Brafilia-** 18. St. corpore supra pallide ex ferrugineo fusco albo ma-
culata, subtus albido maculis ex ferrugineo fuscis.
Astro brasiliensis. *Briff. orn. p. 145. n. 8.*
Cabure ou Caboure. *Will. orn. p. 107. n. 8. Buffon hist.
nat. des ois. I. p. 383.*
Noctua Brasiliensis Cabure dicta. *Raj. av. p. 26. n. 7.*
Brasilian Eared owl. *Lath. syn. I. 1. p. 125. n. 10.*
**Habitat in Brasilia, turdi magnitudine; rostrum, irides,
pedes breves cum digitis flavicant.**
- Novevia.** 19. St. corpore griseo, subtus pallidiore, utrinque maculis
ferrugineis & nigris, capitis pectorisque pennis nigro-
punctatis.
Mottled Owl. *Arct. zool. 2. p. 231. n. 118. t. XI. Lath.
syn. I. 1. p. 126. n. 11.*
**Habitat in Noveboraco, Majo pariens, 11 pollices longa.
Facies alba, fusco maculata; humeri tectricibusque alarum
maculis magnis albis.**
- Indica.** 20. St. dorso obscuro, tectricibus alarum griseis nigro lineatis,
pectore bubalino, maculis exiguis sagittatis nigris.
Little Hawk Owl of Ceylon. *Penn. ind. zool. t. 3.
Indian Eared Owl.* *Lath. syn. I. 1. p. 127. n. 12.*
**Habitat in insula Zeylon, 7 pollices longa.
Rostrum obscurum, setis longis cinctum; caput obscure
fuscum; orbitae pallide cinereæ; pedes seminudi, subtus
ex rufescente flavi.**
- Zorca.** 21. St. auricularum pennis 8-9. *Cetti ucc. di Sardegna. p. 60.
Habitat in Italia; Sardinia, solitaria, non migrans, 7
pollices longa, ululans.
Rostrum ex virescente flavum; digitæ nudi.*