

que fasciatis, rectrices fasciis talibus quinque, versus apicem sensim angustioribus.

27. *Strix flammea*. Lin. *Str. opensis* Smith.

28. — id.

29. — *leucotis* Temm.

30. — id.

31. — *Licua* Licht. Habitu (i. e. partium inter se ratione, praecipue remigum rectricumque longitudine mutua) et pictura, simillima *Str. passerinae* Lin. (*pygmaeae* Bechst.), sed major, 8-pollicaris, differt quoque rectricum fasciis 6 albis latioribus vix linearibus, sed interruptis, e macula utrinque orbiculari conflatis, terminali nulla.

32. — *Licua* Licht.

33. *Lanius melanurus* Smith.

L. macrourus ater, scapulis, tergo et remigum apice candidis. Statura Picae, Longit. trunci 5 poll., caudae gradatae 11 poll.

Ob rostri formam validam abbreviatam attenuatam, ob vibrissas rigidas rostrum undique cum naribus tegentes et caudae formam singularem, a Laniis alienam, digna videtur avis, quae proprium genus constituat, quod nomine: *Bassanistes* salutari placuit. Speciem *B. cissoidem* appellavi-mus.

34. — *melanurus* Smith.

35. — id.

36. — *ornatus* n.

37. — id.

38. — *frenatus* Licht. (totus *senegalensis* sed dimidio minor.)

39. — id.

40. — *frenatus* var.

41. — *collaris* L. Gml. Mas.

42. — id. Fem.

43. — *Cubla* n.

44. — *Brubru* n.

45. *Ceblepyris caesia* Licht.

46. *Muscicapa divaricata* Licht.

47. — *tenella* Licht.