

HISTORIA
FISICA POLITICA Y NATURAL
DE
LA ISLA DE CUBA

POR
D. RAMON DE LA SAGRA.

AVES

POR
MR. ALCIDES D'ORBIGNY

CABALLERO DE LA REAL ÓRDEN DE LA LEGION DE HONOR, OFICIAL DE LA LEGION DE HONOR BOLIVIANA;
AUTOR DEL VIAJE Á LA AMÉRICA MERIDIONAL, etc., etc.

PARIS.

EN LA LIBRERIA DE ARTHUS BERTRAND,
LIBRERO DE LA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA,
CALLE HAUTEFEUILLE, N° 23.

M. DCCC. XXXIX.

10. NOCTUA SIJU. — (*d' Orb.*)

AVES. — LAMINA III.

SIJU.

Noctua fronte albido, supra brunneo, saturatiori, tenuiter subbrunnescente, genis albidis; pectore rufo, transversim rufo-brunnescente radiato; ventre albido, fusco maculato, cruribus rufis; cauda brunnea, lineis quinque transversim distincta.

Longitud total 7 pulg. (0,162 millim.); de la cola 2 pulg. (0,046 millim.)

Frente blanca; una mancha de este color sobre los ojos; todas las partes superiores pintadas de puntos rojos mui claros, mas aproximadas sobre la cabeza, que es algo mas roja que el resto del cuerpo; parte delantera del cuello y pecho roja, rayada á lo ancho de listas morenas interrumpidas sobre la línea media; vientre blanquecino marcado con manchas de un moreno subido; mûslos rojos; tarsos cubiertos de plumas blanquecinas; remiges por encima morenas, con algunas manchas trasversales mas claras y algunas gotitas blancas sobre las mas exteriores; lo inferior del ala, gris moreno con manchas blanquecinas al través; tapadas inferiores de las remiges amarillo de paja; timoneles morenas con cinco listas blancas trasversales interrumpidas sobre el mastil de cada pluma; estas listas son rojas sobre las plumas internas; ojos de un bello amarillo; pico verdoso.

Esta especie parece comun en la isla de Cuba: hállase durante el dia en lo interior de los bosques, donde por la vivacidad de sus movimientos parece mas bien dotada de facultades propias de las aves diurnas que de las nocturnas. Echase á volar velozmente cuando alguno se le acerca, y al posarse á corta distancia se alza sobre las patas, levantando y abriendo la cola al mismo tiempo. Su canto de noche puede expresarse así:



Los sonidos repetidos al principio con rapidez se suspenden de golpe; por lo demas el canto es mui análogo al del CABURÍ de Azara y de las otras especies americanas pequeñas, que se semejan tambien á ésta por el color. El *Siju* parece alimentarse de reptiles é insectos y engorda mucho. Frecuentemente, y aun cuando la cogen adulta, se domestica facilmente. En tal caso, se contenta con carne cruda y lagartijas.

Esta especie es un poco mas grande que el CABURÍ, y se diferencia esencialmente del *Strix chevecoide* de Tem. (láminas iluminadas) por la distribucion de sus tintes. Sin embargo, el individuo que nos sirve de tipo parece ser jóven ¹.

¹ M. Vigors en su Descripción de las aves de Cuba (*Zool. Journal*, 1827, t. III, p. 439) habla del *Strix occipitalis*; mas habiéndole indicado M. Temminck como propio del Senegal,

parece que M. Vigors se equivocó. De todos modos no existe en nuestra Coleccion cubana.



NOCTUA Scju. L. G.