

A V I U M

SPECIES NOVAE,

QUAS

IN ITINERE PER BRASILIAM ANNIS MDCCCXVII — MDCCCXX

JUSSU ET AUSPICIS

MAXIMILIANI JOSEPHI I.

BAVARIAE REGIS

SUSCEPTO

COLLEGIT ET DESCRIPSIT

Dr. J. B. DE S-P I X,

Ordinis Regii Coronae Bavaricae civilis Eques, Academiae scientiarum Bavaricae Socius ordinarius, Musei Regii zoologici, zootomici et ethnographici Conservator, Academiae Naturae Curiosorum, Societatis literariae Edinburgensis, Moscoviensis etc. Sodalis.

TABULAE CXV. A M. SCHMIDT MONACENSIS DEPICTAE.

MONACHII

TYPIS FRANC. SERAPH. HÜBSCHMANNI.

MDCCCXXIV.

nullum; macula auricularis griseo-rufescens, circulo faciali brevi, depresso, albo, nigro-marginato; gula albescens; collum fulvo nigroque subfasciatum; macula pectoralis albescens; pectus abdomenque superius albo-fulvescentia, fulvo-brunneo maculata vel variegata, posterius, femora crissumque fulva; dorsum tectricesque alarum fusco-brunnea, plumis lateralibus albo-rufa ocellatis; alae caudae fere aequales, subtus rufa-fulvae alboque rufae, variegatae nigro-striatae, postice nigro fulvoque transversim maculatae; remiges fusco-brunneae, lateraliter transverse fulvo-albo maculatae, apice fuscae, secundariae apice albo-fulvae; cauda fusco-brunnea, apice albicans, vexillo rectricum interno transverse fulvo-maculato, externo fulvo-subocellato, subtus pallide nigro-fulvoque fasciolatae; rostrum albicans, setis nigris obtectum; tarsi subelevati, sublanuginosi; digiti nigri, subpilosi; ungues nigri. Longitudo corporis $8\frac{1}{4}$, caudae 3, tarsi $1\frac{3}{4}$.

Habitat diu in campis provinciarum Minas Geraes et Paraë. Mas a foemina non distinctus. Spec. 4.

SPECIES 4. STRIX CRUCIGERA. TAB. IX.

Minor, griseo brunnescens supra, subtus sordide albicans, striis longitudinalibus, decussatis, fusco-brunneis; collari auriculari depresso, vix conspicuo; femoribus rufis; tarsis brevibus, sublanuginosis; plumis dorsi lateralis longitudinaliter albo substriatis.

DESCRPTIO. Corpus praecedente parum minus, plumis supra, praecipue subtus fusco-brunneo longitudinaliter striatis lineolisque decussatis, ad radicem nigro cinereis; caput tectricesque alarum dorsique fusco brunnescentia, plumis fulvo fuscoque brunneo decussatis; macula auricularis ad radicem fulvescens, apice nigricans; collum, praecipue pectus abdomenque albicantia plumis medio fusco-brunneo longitudinaliter striatis, lineolis transversis decussatis; crissum rufescens, vix fusco lineolatum; femora rufa; plumae dorsi laterales in vexillo externo albicantes; alae subtus ad marginem axillarem medioque fulvae, postice fusco-nigro fulvoque fasciatae; remiges cauda subbreviores, rufa-fulvo, brunneoque nigro fasciati, apice rufescenti grisei, secundarii medio intus fulvescentes, apice brunneo-griseo variegati; cauda aequalis, fusco-brunneo rufa 8 fasciata, apice griseo variegata; rostrum plumis fulvis setisque nigris subobtectum, apice

23
fulvo flavicans; oculi brunnei, supra fulvo striati; tarsi breves, sublanuginosi; ungues flavicantes. Longitudo corporis $7\frac{1}{4}$ ', caudae $3\frac{1}{4}$ ', caud. alis long. $\frac{1}{2}$ ', tarsi 1'. Mas.

Habitat in pratis campestribus juxta flumen Amazonum. Sp. 1.

SPECIES 5. **STRIX UNDULATA.** TAB. X.

Minor, rufescenti grisea; plumis supra fulvo fuscoque brunneo-, subtus albo-fulvo fuscoque brunneo undulatis; tarsi brevibus, semilanuginosis; cauda alis brevior.

DESCRIPTIO. Corpus strige atricipite Tem., crucigeraque parum minus, plumis omnibus albedo-fulvo fuscoque nigro undulatis, ad radicem nigris, subtus sordide albescent, albo-fusco brunneoque fulvo undulatum; caput depressum, rufescenti griseum, plumis albo-fulvo fuscoque brunneo tenerrime fasciolatis, supra oculos nigricans; macula auricularis rufo nigroque cincta; collum dorsumque magis fusco-brunnea; tectrices alarum anteriores apice subalbicantes, posteriores brunneo nigricantes, rufo subfasciatae; alae cauda longiores, subtus antice rufescentes, nigro striatae, postice fulvo nigroque fasciatae; remiges longi, nigro-brunnei, fulvorufo fasciati vel maculati, maculis vexilli externi quadratis, medio nigrido punctatis, apice rufo brunneoque grisei; cauda brevis, nigro-brunneo variegata, rufo irregulariter fasciata, apice grisea; rostrum canescens; nares rotundae; tarsi breves, semilanuginosi; digiti medio flavo-albescentes; ungues fusi. Longitudo corporis $6\frac{1}{2}$ ', caudae $2\frac{3}{4}$ ', tarsi 1'.

Habitat in campis paludosis provinciae Minas Geraes. Sp. 1.

SPECIES 6. **STRIX ALBOMARGINATA.** TAB. X.

Majuscula, nigra, brunneo renitens, supra et subtus tenerrime albo undulata; tarsi nigro-griseis, lanuginosis; cauda nigra, albo 4 fasciolata, apice albomarginata.

DESCRIPTIO. Corpus magnitudine Corvi, supra et subtus nigrum, fusco-brunneo renitens, plumis omnibus albo 5 fasciolatis, fasciis albis abdominis, femorum crissique latioribus; caput crassum, plumis depressis; rostrum flavum, mentum palpebraeque setis nigris munita; orbitae plumis brevioribus, rigidis, nigro-albo fasciolatis annulariter circum-



Syrinx cristata.

Chouette à fleches.

Tab: IX.