

Verzeichnifs

der

Doubletten des zoologischen Museums

der Königl. Universität zu Berlin

nebst

B e s c h r e i b u n g

vieler bisher unbekannter Arten

von

Säugethieren, Vögeln, Amphibien und Fischen

herausgegeben

von

Dr. *H. Lichtenstein*

erstem Director des Museums und ordentlichem Professor an der Königl. Universität.

Mit 1 terminologischen Kupfertafel.

Berlin, 1823.

In Commission bei T. Trautwein.

605. *C. campestris* n. — *Nacunda* Azar. 312. — *Capr. diurgus* Pr. Max. Temm. Pl. color. 182. San Paulo. E. 4
 Obs. Specimen a Temminckio depictum coloribus dilutioribus et magnitudine inferius fuisse videtur, caeterum non discrepans. Nostra nigri plus quam ferruginei habent, 11" longa.
606. *C. albicollis* Lin. Gm. Cayana E. 4
607. *C. virginianus* Lin. Gm. Carolina E. 3½
608. *C. indicus* Lath. Terr. Caffr. E. 3
609. *C. asiaticus* Lath. — *Engoulevent à collier* Le Vaill. Afr. tab. 49. — Terr. Caffror. E. 3
610. *C. aegyptius* N. Aegypt. super.
C. pallide cinereus, fasciis denticulatis nigris verticis dorsi remigum et rectricum, subtus isabellinus, fascia gulari alba, pectore nigro-undulato. Longit. 9". — Remiges pogonio interno serratim albo nigroque pictae. Cauda aequalis, alis complicatis paulo longior. Fem. a masculo vix differt. E. 4
611. *C. nubicus* N. Nubia.
C. pallide cinereus, vertice dorso tectricibusque nigro striolatis, isabellino guttatis, fascia gulari alba, pectore abdomineque nigro-undulatis. Longit. 8". Remiges primores quatuor nigrae fascia media alba, reliquae rufae fasciis 4 — 5 nigris. Cauda alis complicatis longior, aequalis, rectricibus rufescentibus nigro fasciatis, duabus utrinque extimis apice albis. E. 3

S T R I X.

612. *S. uralensis* Pall. Siberia E. 10
613. *S. perlata* n. *Tuidara* Marcgr. *Effraye* Azar. 46. *Valde affinis S. flammeae, sed tarsi longioribus insignis.* Brasil. E. 3
614. *S. cunicularia* Lin. Gm. Lath. — *Urucurea* Azar. 47. — *S. grallaria* Temm. et Laug. Pl. col. 146. — *A congeneribus differt tarsi valde elongatis, lanugine brevi obtectis; in Dasypodum cuniculis nidificans. Longit. 9", tarsi 2¼".* San Paulo E. 3
615. *S. decussata* n. — *Choliba* Azar. 48.
S. auriculata, abdomine albo lineis angustis fuscis decussatis. Longit. tota 9", caudae 3", tarsi 1¼". Bahia E. 3