

NOUVEAU RECUEIL
DE PLANCHES COLORIÉES
D'OISEAUX,

POUR SERVIR DE SUITE ET DE COMPLÉMENT AUX PLANCHES ENLUMINÉES DE BUFFON,

ÉDITION IN-FOLIO ET EN-4° DE L'IMPRIMERIE ROYALE, 1770;

PUBLIÉ PAR

C. J. TEMMINCK,

CHEVALIER DE L'ORDRE DU LION NÉERLANDAIS; DIRECTEUR DU MUSÉE ROYAL DES PAYS-BAS; MEMBRE DE L'INSTITUT; MEMBRE CORRESPONDANT DES ACADEMIES DE STOCKHOLM, DE SAINT-PÉTERSBOURG ET DE BONN; DES SOCIÉTÉS ROYALES DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE LINNÉENNE ET ZOOLOGIQUE DE LONDRES; DE LA SOCIÉTÉ IMPÉRIALE DE MOSCOU; DE CELLES DES NATURALISTES DE HARLEM, UTRECHT, GRONINGUE, PARIS, LAUZANNE, LILLE, STOCKHOLM, FRANCFORT, MAYENCE, HALLE, HARBOURG, WÜRZBOURG, HEIDELBERG, HANAU, BATAVIA, PHILADELPHIE ET CAP DE BONNE ESPÉRANCE,

LE BARON MEIFFREN LAUGIER DE CHARTROUSE,

CHEVALIER DE LA LÉGION-D'HONNEUR.

D'après les Dessins de MM. HUET et PRÉTERE, Peintres attachés au Muséum d'Histoire naturelle.

ET AU GRAND OUVRAGE DE LA COMMISSION D'ÉGYPTE.

VOL. III.

PARIS.

F. G. LEVRAULT, LIBRAIRE-ÉDITEUR, RUE DE LA HARPE, N. 81.

À STRASBOURG, MÊME MAISON, RUE DES JUIFS, N. 55.

ET À AMSTERDAM, CHEZ LEGRAS IMBERT ET COMP., SUR LE ROCKIN, N. 159

M. DCCC. XXXVIII.

CHOUETTE HIRSUTE.

STRIX HIRSUTA. TEMM.

L'Adulte. — Planche 289.

CETTE espèce nouvelle est facile à distinguer de toutes les autres Chouettes connues par les aspérités dont les doigts sont bordés; une rangée de poils très-gros, raides et placés symétriquement comme les dents d'un peigne, garnit les côtés des doigts depuis leur insertion jusqu'à l'origine des ongles; leur partie supérieure est couverte de poils clair-semés, les tarsi le sont entièrement de plumes serrées. La queue est longue, à pennes d'égale longueur, couvertes en grande partie par les ailes.

Le front et le lorum sont blancs, mais les poils qui prennent leur origine dans cet espace et qui couvrent une partie du bec, sont noirs. Le sommet de la tête et la nuque ont une teinte brune-cendrée; le dos, les couvertures des ailes et les pennes sont d'un brun uniforme et sans taches: mais on voit en soulevant les plumes scapulaires de grandes taches blanches placées sur les barbes intérieures de ces plumes et sur les pennes secondaires les plus proches du corps; toutes ces taches sont cachées par les barbes extérieures lorsque l'aile est en repos. La gorge est roussâtre; la poitrine et le ventre d'une teinte blanche couverte

CHOUETTE HIRSUTE.

de grandes taches brun-roussâtres; les couvertures inférieures de la queue blanches marquées de taches brunes peu nombreuses; les doigts marbrés de roux et de brun; leurs parties nues paraissent avoir été jaunâtres dans le vivant, et les poils durs et raides dont ils sont garnis d'un roux-clair. Le bec est noir, mais son arête est blanche. Les pennes de la queue sont rayées de quatre bandes brunes et de quatre bandes cendrées très-régulières; le bout de toutes ces pennes est blanc. Les sexes paraissent différer uniquement par de plus fortes dimensions chez les femelles. Longueur totale du mâle, neuf pouces et demi; de la femelle, onze pouces et quart.

M. Leschenault a rapporté deux individus de l'île de Ceylan; on la trouve aussi à la Cochinchine, d'où elle a été envoyée par les soins de M. Diard.

Musées de Paris et des Pays-Bas.



Chouette hirsute, adulte.