

**NOUVEAU
DICTIONNAIRE
D'HISTOIRE NATURELLE,**

APPLIQUÉE AUX ARTS,

**A l'Agriculture, à l'Économie rurale et domestique,
à la Médecine, etc.**

**PAR UNE SOCIÉTÉ DE NATURALISTES
ET D'AGRICULTEURS.**

**Nouvelle Édition presque entièrement refondue et considé-
rablement augmentée ;**

AVEC DES FIGURES TIRÉES DES TROIS REGNES DE LA NATURE.

TOME VII

DE L'IMPRIMERIE D'ABEL LANGE, RUE DE LA HARPE.

A PARIS,

CHEZ DETERVILLE, LIBRAIRE, RUE HAUTEFEUILLE, N° 8.

M DCCC XVII.

versales, alternativement d'un brun plus ou moins clair sur les pennes des ailes, avec des taches d'un blanc sale sur les bords extérieurs, et d'un brun foncé sur les secondaires; la queue rayée transversalement de brun et de blanc; le ventre et le bas-ventre blanchâtres, avec des raies d'un brun ferrugineux; longitudinales sur le premier, et transversales sur le second, le duvet des pieds et des doigts d'une teinte pâle. Cette espèce habite la baie d'Hudson pendant l'été, et se retire, pendant l'hiver, dans les États-Unis.

La CHOUETTE NOCTUELLE, *Strix noctua*, Lath., n'est point une espèce particulière, mais une variété de la CHOUETTE HULOTTE.

La CHOUETTE DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE. V. CHOUETTE FAUVE.

La CHOUETTE NUDIPÈDE, *Strix nudipes*, Lath., pl. 16 de l'*Hist. des Oiseaux de l'Am. sept.*, a sept pouces et demi de long; le dos d'un fauve rembruni; les petites couvertures des ailes tachetées de blanc, le dessous du corps d'un blanc sale, avec des taches brunâtres et lyrées; les pieds nus et bruns, le bec noirâtre. Cette espèce se trouve à Porto-Ricco et à Saint-Domingue.

La CHOUETTE ONDULÉE, *Strix undulata*, Lath. Cette espèce, qui se trouve dans l'île de Norfolk, a douze pouces de longueur; le dessus du corps de la même couleur que le hibou à aigrettes courtes; les couvertures des ailes et les petites plumes marquées de blanc à leur extrémité; la tête, la gorge et tout le dessous du corps ondulé de blanc; le bec de couleur de plomb; les plumes du tarse jaunes, les doigts nus et les ongles noirs.

La PETITE CHOUETTE. V. CHOUETTE CHEVÊCHE.

La CHOUETTE DE PORTO-RICCO. V. CHOUETTE NUDIPÈDE.

La CHOUETTE RAYÉE DE LA CHINE. V. CHOUETTE JOUGOU.

La CHOUETTE ROUGE. V. CORACIAS.

La CHOUETTE ROUGE-BRUN. V. CHOUETTE CHEVÊCHETTE.

La CHOUETTE DE SAINT-DOMINGUE, *Strix dominicensis*, Lath., me paroît être de l'espèce de la CHOUETTE SUINDA. V. ce mot.

La CHOUETTE DE SOLOGNE, *Strix sologniensis*, Lath., n'est point une espèce particulière, mais bien une variété de la chouette hulotte. Elle a la face blanche; la collerette et le sommet de la tête variés de taches blanches et de roussâtre; le dessus du corps d'un brun noirâtre, nuancé de fauve; le dessous des ailes et de la queue blanchâtre; le bec noirâtre, ainsi que les ongles.

La CHOUETTE À SOURCILS BLANCS, *Strix superciliaris*, Vieill. Face d'un blanc roussâtre; larges sourcils blancs; bec de

cette couleur; parties supérieures d'un brun marron, parsemé de petits points blancs sur la tête et de quelques mouchetures arrondies sur les ailes; parties inférieures blanches, avec des bandes transversales d'un brun marron, très-rares sur le ventre, et nulles sur les parties postérieures; doigts velus; bec allongé, couleur de corne jaunâtre; taille un peu supérieure à celle de notre chevêche. Cet oiseau est au Muséum d'Histoire naturelle. Je ne connois pas son pays.

La CHOUETTE SUINDA, *Strix suinda*, Vieill. Nous devons la connoissance de cette chouette à M. de Azara, ou du moins une description plus détaillée de la chouette ou grande chevêche de Saint-Domingue, si, comme le dit Sonnini dans sa traduction, elles appartiennent l'une et l'autre à la même espèce; mais ce ne peut être la chouette ou grande chevêche d'Europe, puisque le suinda a la tête sans aigrette et que l'autre en a deux, courtes il est vrai, qui lui ont valu le nom de *brachyotos*. Le suinda n'entre point dans les bois et ne se perche pas sur les arbres; il fréquente les campagnes découvertes et abondantes en gibier, se cache dans les trous ou les terriers des tatous, mais il n'en creuse pas lui-même; ce qui suffit pour ne pas le confondre avec la chouette à terrier, qui fait elle-même celui dans lequel elle niche, et son seul abri dans les temps de repos: fait que j'ai vérifié à Saint-Domingue. Le *suinda* chasse une heure avant le coucher du soleil, volant en ligne directe et sans discontinuité à cinq à six pieds au-dessus du sol, pour fondre sur le gibier qu'il découvre. Il est fort rare, et ne se voit au Paraguay qu'au vingt-septième degré: cependant on dit qu'on le trouve plus communément au sud de la rivière de la Plata.

Il a quatorze pouces et demi de longueur; la collerette noirâtre, et tachée de gris roussâtre sur les bords, brune avec des lignes noirâtres au centre, avec un peu de blanc à l'angle antérieur de l'œil; les plumes de la tête, de la gorge et du cou d'une teinte sombre dans le milieu, et d'un brun roussâtre sur les bords; la couleur de la poitrine plus claire, avec des raies déliées et longitudinales; le ventre et les parties postérieures d'un gris roussâtre; quelques taches noires, oblongues et pointues sous l'aile; le dessus du corps, des ailes et de la queue noirâtre, varié de brun et moucheté de gris roussâtre; le bec sombre et l'iris jaune.

La CHOUETTE TENGMALM, *Strix tengmalmi*, Lath., a huit pouces quatre lignes de longueur; tout le corps d'un roux rembruni et noirâtre, avec des taches blanches, arrondies sur la tête et sur le dessus du cou; l'iris d'un jaune brillant; le bec jaune; les pieds et les doigts couverts d'un duvet blanc. La femelle est un peu plus forte que le mâle; son plu-