

# Anales Científicos Paraguayos

PUBLICADOS BAJO LA DIRECCIÓN

DEL

DR. MOISÉS S. BERTONI

N.º I	SÉRIE I	PUERTO BERTONI (PARAGUAY)	ENERO 1901
-------	---------	------------------------------	------------

## CONTENIDO:

AVES NUEVAS DEL PARAGUAY.. . . .	POR A. DE W. BERTONI
CATÁLOGO DE LAS AVES.. . . .	« « « « «
ORTOGRAFÍA TÉCNICA... . . . .	« « « « «



ASUNCIÓN 1901

# Aves Nuevas del Paraguay

---



CONTINUACIÓN A AZARA

— POR —

A. de WINKELRIED BERTONI

(EXTRACTO DE LA HISTORIA NATURAL DE LAS AVES  
DEL PARAGUAY)

---

DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES NUEVAS DESCUBIERTAS POR EL AUTOR  
Y CONTRIBUCIONES AL ESTUDIO DE LA  
AVIFAUNA PARAGUAYA

---

MATERIALES RECOJIDOS DESDE 1890 HASTA FINES DE 1900.

---



ASUNCIÓN  
TALLERES NACIONALES DE H. KRAUS  
ENERO DE 1901.

son blanquizas con baño de canela, las del orden mayor tienen la punta parda. Las *rémijas* son marcadas inferiormente como superiormente, pero con coloración menos viva. Las plumas de la *cola* á fondo pardo-oscuro con fajas transversales de acanelado obscuro, y de abajo la misma coloración más apagada. Las fajas marcan la misma tendencia observada sobre las *rémijas*, pero en suma más regulares. *Ojo* celeste. *Uñas* trigueñas á la raíz, pasando insensiblemente al negro hacia la punta.

**Observ.**—Cazado en Djaguarasapá, Julio de 1891. Estaba sobre un árbol aislado. Jamás le he vuelto á ver.

---

Nº 112: **Syrinium Koeniswaldianum** M. & W. Bertoni  
(sp. n.) — **Sihindá kaágwih**

---

(Especie dedicada al Dr. Gustavo Koeniswald; el nombre guaraní es moderno y le aplican para diferenciarla de las especies campestres que llaman también *Sihindá*, pues el apelativo equivale á silvestre ó que habita los bosques; pero lo aplican á varias especies de costumbres y magnitud análoga).

**Dimens.**—Lonj. 433. Braza 1060. Alto 370. Cola 190. Ala dobl. 312. *Cabeza*: lonj. 72, ancho 54, alto 42. *Pico*: lonj. 35, 34 y 20; ancho 18, alt. 22. *Pierna* 89, tarso 48; dedos: med. 34+19, int. 32+22, ext. 27+17, post. 20+15. *Ojo*, diám. 20.

**Caract. físicos.**—Cuerpo macizo; esqueleto muy sólido. Pico muy fuerte; mandíbula superior con bordas algo *crenadas*. Ojo asaz grande, saliente, provisto de una *corona huesosa perioftálmica* desarrollada y saliente, que lo envuelve bien. Círculo perioftálmico *poco marcado*, no muy abierto, poco regular. Apertura auricular bastante grande, operculada. Plumaje abundante, largo. Alas redondas; *rémijas* 23, la 5ª mayor, la 6ª casi igual; las medianas y posteriores casi tan largas como las primarias, lo que forma un contorno jeneral casi rectangular. Cola larga, truncada, con 12 *rectrices* casi iguales, las externas 10 mm. más cortas. Pierna y tarso cortos, cubiertos de plumitas muy densas, las posteriores lanosas. Dedos completamente *desnudos*, los tres mayores con callosidades salientes. Uñas poco y regularmente encorvadas, finamente agudas.

**Color.**—Todo lo *superior* del cuerpo es castaño obscuro uniforme y lustroso; llevan únicamente las *rémijas* rayas transversales blancas casi apagadas, oblicuas en las primarias; y las *rec-*

*trices* iguales rayas más angostas, más vivas, y un ribete blanco en la punta. Una *ceja* color blanco acanelado sale de la raíz del pico, pasa en forma de arco sobre el ojo, y acaba sobre los oídos. *Bigotes* blancos con el mástil negro y dirigidos hácia adelante; plumitas de la *horqueta* blancas y casi idénticas.

Sobre la *garganta* una mancha blanca, y abajo un collar castaño. *Pecho, costados, tapadas* menores, *vientre y piernas*, blanco acanelado, con la base oculta de las plumas aplomada. *Rémijes* y *cola* inferiormente como superiormente, pero más claras y plateadas; *tapadas* mayores y subcaudales blancas. *Dedos* aplomado claro; *uñas* de punta negruzca, *Pico* azulado á la base y blanco azulado hácia la punta. *Iris* pardo-oscuro.

**Obs.**—Difiere del *S perspicillatum* (Lath.) ó *Nacurutú Mocho*, de Azara, sobre todo por el color de la facie superior del cuerpo. Azara dice que las dimensiones de un *Nacurutú Mocho* son las del *Bubo magellanicus* (Gml.) si esto es exacto, las de nuestra especie difieren mucho, especialmente al respecto de las piernas, tarsos, braza y dedos, que todos son notablemente menores, especialmente las piernas y los tarsos; mientras la longitud es igual y la cola algo más larga. Distínguese además por la extensión mucho menor de la ceja blanca que no encierra al ojo, y es formada de plumas más cortas que las de la cabeza—por la disposición de los colores sobre la horqueta y la garganta—por los dedos absolutamente desnudos ó sin pelos—por el pico, el círculo perioftálmico, el color del iris, etc.

**Costumbres**—Al parecer crepusculares y nocturnas como las del *S. suindá*; el descrito fué muerto en noche de luna.

**Clasif.**—La corona *huesosa perioftálmica* existe también más ó menos en todo el orden; pero ningún autor que yo conozca la indica para las otras especies. Nitzsch no la ha evidentemente observado tampoco (V. Brehm 489). Por otra parte el *S. aluco*, especie típica cosmopolita, difiere mucho de nuestra especie, por varios caracteres físicos. De manera que es posible sea preciso formar con ésta y el *S. supercillatum* un género aparte, quedando el *S. suinda* con los *Syrnium*.

---

N.º 113: **Syrnium Borellianum** W. Bertoni (sp. n.)  
**Sihindá** sp.

---

(Especie dedicada al Dr Alfredo Borelli. También á esta como, á la siguiente llaman los indios *Sihindá* y los campesinos *Suindá*