

Центрально-сибирская длиннохвостая сова.

С. А. Бутурлинъ.

Strix uralensis yenisseeensis subsp. nov.

By S. A. Buturlin.

Серія въ 18 экземпляровъ длиннохвостыхъ совъ отъ каждого мѣсяца съ сентября по апрѣль изъ окрестностей Красноярска (9—Красноярскаго музея и 9—частной коллекціи А. Я. Тугаринова), а также Ачинскаго уѣзда и Кемчугской тайги, по окраскѣ не можетъ быть отличена отъ типичной волжско-уральской *S. u. uralensis* Pall., хотя нѣкоторые экземпляры и склонны къ слегка болѣе темной окраскѣ, какъ я говорилъ въ нашей съ А. Я. Тугариновымъ работѣ („Матеріалы по птицамъ Енисейской губ.“, 1911 г., стр. 160). Но тогда какъ у типичной птицы крыло всегда длиннѣе 350-ти, а хвостъ 280—320-ти m.m., у енисейской формы (размѣры любезно взяты А. Я. Тугариновымъ, которому я за это крайне признателенъ) крыло 328—350, среднее для 18 птицъ $339\frac{2}{3}$, хвостъ 235—282, среднее $264\frac{1}{3}$, и клювъ отъ ноздрей 18—21.8, среднее 19.8 m.m. Слѣдовательно размѣры близки къ амурско-сахалинской *S. u. nikolskii* But., но послѣдняя потемнѣе, и основной цвѣтъ темныхъ частей ея иной, значительно болѣе „теплый“, коричневатый, менѣе землисто-бурый, что хорошо видно на мелкихъ кроющихъ крыла. Западно-сибирскія птицы, описанныя изъ Томска фонъ Чузи подъ именемъ *Syrnium uralense sibiricum* („Orn. Jahrb.“, 1903, p. 166, nec *Strix sibirica* Schleg. u. Susem. Vög. Eur., 1843), относятся и по окраскѣ, и по величинѣ видимо къ типичной формѣ. Во всякомъ случаѣ

название его не могло бы удержаться. Называю этих енисейских птиц *Strix uralensis yenisseeensis*.

Summary.

Eighteen birds from near Krassnoyarsk, from Achinsk distr. and from Kemchug, procured every month from Sept. till April, differ not from series of Volga-Ural *S. u. uralensis* Pall. in colouring, though some Yenissei birds are not quite so whitish. But whereas *S. u. uralensis* has wing always more 350 m.m. long, and tail 280—320 m.m., Yenissei birds have wing 328—350, mean $339\frac{2}{3}$ m.m., tail 235—282, mean $264\frac{1}{3}$ m.m., bill from nostrils 18—21.8, mean 19.8 m.m. These dimensions are very near those of Amur-Sakhalien *S. u. nikolskii* But., but this last is darker and dark parts (especially wing covering) are decidedly warmer. I name it *Strix uralensis yenisseeensis*. „*Syrnium uralense sibiricum*“ of Western Siberia (von Tschusi, Orn. Jahrb., 1903, p. 166, Tomsk) nec *Strix sibirica* Schleg. u. Susem. Vög. Eur. 1843—seems to be undistinguishable from typical form.

