

Verhandlungen

der kaiserlich-königlichen


zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien.

Herausgegeben von der Gesellschaft.

Jahrgang 1863.

XIII. Band.

Mit 25 Tafeln.



Wien, 1863.

Im Inlande besorgt durch **W. Braumüller**, k. k. Hofbuchhändler.

Für das Ausland in Commission bei **F. A. Brockhaus** in Leipzig.

Sr. kaiserlichen Hoheit

dem durchlauchtigsten Herrn Erzherzoge

Ludwig Josef

widmet

diesen Band ihrer Schriften

in

tiefster Ehrfurcht

die Gesellschaft.

Ueber vier von Natterer in Brasilien gesammelte, noch unbeschriebene Vogelarten.

Von

August von Pelzeln,

Custos-Adjunct am k. k. zoologischen Cabinet.

Vorgelegt in der Sitzung vom 10. October 1863.

Syrnium superciliare Natterer.

S. capite supra, nucha, dorso, uropygio alarumque tectricibus superioribus nigro-brunneis fasciis transversalibus angustis irregularibus ferrugineis, scapularibus pluribus et alarum tectricibus majoribus nonnullis pogonio externo latius vel angustius pure albis, remigibus rufescente-brunneis, pogonio externo maculis 6—7 subquadratis, pallide ferrugineis, pogonio interno totidem fasciis ejusdem coloris, tectricibus alarum inferioribus ferrugineo-albis, majoribus albis macula longitudinali brunnea, fronte et superciliis albis, disco faciali obscure ferrugineo, interdum nigro admixto, margine ab oculo ad aures ferrugineo, ab auribus versus rostrum albo cincto, plumis pectoris pallide ferrugineis vel partim albis fasciis brunneis transversalibus interdum et longitudinalibus, plumis abdominis et laterum corporis albis hinc inde ferrugineo lavatis, singula stria scapali rufo-brunnea, taribus ad basin digitorum usque plumis ferrugineis vestitis, caudae rectricibus obscure brunneis, fasciis transversalibus 5—6, 2—3" latis, supra pallide ferrugineis hinc inde praesertim in pogonio interno albis, subtus totis albis, iride flava, rostro viridi flavo, digitis flavidis. Longit. 15" ¹⁾, alae fere 10".

Hab. Brasilia.

¹⁾ Nsch Natterer 16".

Diese Art steht *Syrnium albitarse* Gray nahe, unterscheidet sich aber durch geringere Grösse und durch einfache Schaftstriche am Unterleibe von der Brust abwärts.

Natterer bemerkte in seinem handschriftlichen Cataloge folgendes über diese Eule:

***Strix superciliaris* Natterer. N. 753.**

Mato grosso. 21. October 826. Männchen in der Mauser; wurde in der Nacht am 16. October im Walde an der Brücke des Guaporé geschossen. Iris gummiguttgelb. Schnabel grünlichgelb. Die nackten Zehen gelblich hautfarb. Klauen graulich hautfarb, die Spitze schwärzlich. Die fünfte Schwungfeder die längste. 12 Schwanzfedern. Länge des ausgestopften Vogels 16", Breite 31" 2"', der Schwanz ragt 1" über die Flügelspitzen, Schnabel 15"', Tarse 19"', mittelste Schwanzfedern 4" 10"', die äussersten um 5" kürzer.

Ein zweites Männchen wurde am 18. October geschossen, es war ebenfalls in der Mauser. Schnabel sehr blass grünlichgelb. Länge des ausgestopften Vogels 16", Breite 33" 2"' (diese Breite scheint richtiger, da die Flügel noch weich waren), Schnabellänge 16"', Tarse 21"', mittelste Schwanzfeder 5 1/2"', die äusserste ist um 4" kürzer.

***Tinamus guttatus* Natterer.**

T. pileo, loris et regione parotica brunnescente-cinereis, plumis laterum capitis et colli, juguli et plumis parum elongatis nuchae pallide ferrugineis nigro limbatis, interdum transverse vel longitudinaliter striatis, plumis dorsi et uropygii rufo-olivaceis, fasciis duabus transversalibus nigris, irregulariter undulatis, saepe interruptis et guttis parvis albo-flavidis inter se aequidistantibus 1, 2 vel 3 in utroque margine plumae, tectricibus caudae superioribus colore dorsi fasciis pluribus angulosis nigris et ferrugineis alternantibus, tectricibus alarum superioribus brunneo-olivaceis, sicut in dorso flavido-guttatis, fasciis nigris in minoribus nullis, in majoribus per punctula plus minusve conferta, indicatis, tectricibus alarum inferioribus et remigibus cinereo-brunneis, his subtus pogonio interno late griseo marginatis, remigibus ultimis et secundariarum pogonio externo dorso concoloribus sed fasciis nigris 5—8 interdum e maculis parvis irregularibus compositis et guttarum loco fasciis transversalibus brevibus pallide ferrugineis ad 5 in pogonio singulo, gula alba, pectore olivascante ochraceo interdum nigrescenti parum vermiculato, abdomine ochraceo medio albo, corporis lateribus tibiis plumis et crisso ochraceis, fasciis transversalibus nigrescentibus, tectricibus caudae inferioribus ferrugineo-rufis, obsolete nigro vermiculatis, tectricibus supra colore dorsi maculis et fasciis ferrugineis plerumque maculis vel fasciis duabus nigris limbatis, rostri maxilla nigrescente apice pallido, mandibula